


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ



## دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی

عنوان:

بررسی فراوانی انواع تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل عطallo

اساتید مشاور:

دکتر وحید عباسی

دکتر فیروز امانی

نگارش:

ایدین محمد علیزاده

زمستان 97

شماره پایان نامه: 0729

با سپاس از سه وجود مقدس :

آن که ناتوان شد تا به توانایی برسم ...

موهایش سپید شد تا روسفید شوم ...

و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود م و  
روشنگر راهم باشند ...

پدرم

مادرم

استادانمان

# بررسی فراوانی انواع تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS) مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل

چکیده

**سابقه و هدف:** یکی از بیماری هایی که خطر تشنج را در فرد افزایش می دهد، مالتیپل اسکلروز است. در مطالعات متعددی ابتلا به مالتیپل اسکلروز به عنوان ریسک فاکتور برای تشنج بیان شده است. این مطالعه‌ی با هدف بررسی فراوانی انواع تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل انجام شد

**مواد و روش ها:** این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. برای جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه‌ای تهیه شد که در بر دارنده‌ی سوالاتی در رابطه با مشخصات دموگرافیک، سابقه خانوادگی بیماری و علائم زمان شروع بیماری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز بود. بعد از تکمیل کردن چک لیست ها و داده های حاصله، داده ها در نرم افزار spssv21 و با استفاده از SPSSv21 روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار تحلیل آماری 21 شد. در مواردی که اطلاعات از نوع کیفی بود کدگذاری و تحلیل کیفی انجام شد. از روش های آمار توصیفی برای بررسی نحوه توزیع نسبی متغیرهای کمی و از آمار استنباطی برای ارزیابی تفاوت های کیفی بین گروه های مختلف استفاده شد.

**یافته ها:** در این مطالعه تعداد 250 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. که 17 نفر از این بیماران یعنی 8/6 درصد مبتلا به تشنج بودند. میانگین سنی بیماران دارای تشنج در مطالعه‌ی حاضر 36/1±11/1 سال بود. از 17 بیمار دارای تشنج در مطالعه‌ی حاضر 5 بیمار مرد (29/4٪) و مابقی زن بودند و در کل 2 درصد از مردان و 4/8 درصد از زنان دارای تشنج بودند. در این مطالعه تعداد 213 بیمار فاقد سابقه خانوادگی MS بودند. بیشترین شیوع در هر دو جنس تشنج ژنرالیزه بود و ارتباط معناداری بین جنسیت و نوع تشنج وجود نداشت. در بین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 94 نفر از آنها اولین علایم MS در آنها به صورت اختلال بینایی بود که 7 نفر یعنی 44/7 درصد تشنج داشتند 7 نفر از آنها یعنی 41/2 درصد قبل از MS دچار تشنج شده بودند و 10 نفر از آنها یعنی 58/8 درصد بعد از ابتلا به MS دچار تشنج شده بودند. از بین افرادی که سابقه قبلی تشنج داشتند 4 مورد اظهار میداشتند که بیماری تشنج آنها بعد از ابتلا به MS تشدید یافته است

**نتیجه گیری:** با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه فراوانی تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز بیشتر از افراد عادی جامعه می باشد

**کلمات کلیدی:** تشنج، مالتیپل اسکلروز، پرسشنامه بیماران

## فهرست مطالب

Error! Bookmark not defined.	فصل اول : طرح تحقیق .....
Error! Bookmark not defined.	1-1 مقدمه و بیان مسئله .....
Error! Bookmark not defined.	1-2 تعریف واژه ها .....
Error! Bookmark not defined.	1-3 اهداف پژوهش .....
Error! Bookmark not defined.	1-3-1 هدف کلی .....
Error! Bookmark not defined.	1-3-2 اهداف اختصاصی .....
Error! Bookmark not defined.	1-3-3 اهداف کاربردی .....
Error! Bookmark not defined.	1-3-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق .....
Error! Bookmark not defined.	فصل دوم : بررسی متون .....
Error! Bookmark not defined.	2-1 مبانی نظری .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-1 مالتیپل اسکلروز: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-2 اپیدمیولوژی: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-3 اتیولوژی: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-4 علائم بالینی: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-5 دوره بیماری: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-6 تشخیص: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-7 درمان: .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-8 تشنج .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-9 تشنج های پارشیل .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-10 تشنج پارشیل ساده .....
Error! Bookmark not defined.	2-1-11 تشنج پارشیل کامپلکس .....

<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-12
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-13
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-14
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-15
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-16
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-17
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-1-18
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	2-2
<b>فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق</b>		
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-1
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-2
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-3
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-4
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-5
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-6
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	3-7
<b>فصل چهارم : نتایج</b>		
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	4-1
<b>فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری</b>		
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	5-1
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	5-2
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	.....	5-3

**Error! Bookmark not defined.** ..... 5-4 محدودیت‌های مطالعه .....

**Error! Bookmark not defined.** ..... منابع .....

## **فهرست جداول، نمودارها و شکل‌ها**

- 12 شکل 1-1: نمای شماتیک انواع حملات در بیماران
- 13 شکل 1-2: پلاک‌های تشکیل شده در مالتیپل اسکلروز
- 30 نمودار 1-4: فراوانی گروه‌های سنی مختلف
- 31 جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار سن مراجعان دارای تشنج به تفکیک سن
- 31 نمودار 2-4: درصد جنسیت بیماران دارای تشنج
- 32 جدول 2-4: توزیع فراوانی نسبی (درصد) تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز بر حسب سابقهٔ فامیلی MS
- 33 جدول 3-4: فروانی و درصد نوع تشنج به تفکیک جنس
- 34 جدول 4-4: توزیع فراوانی نسبی (درصد) تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز بر حسب اولین علایم شروع
- 35 جدول 5-4: جدول توزیع فراوانی (درصد) تشنج قبل از بیماری MS
- 35 جدول 6-4: جدول توزیع فراوانی (درصد) تشدید علایم تشنج بعد از ابتلا به بیماری MS

