


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری رشته پزشکی

عنوان

مقایسه تاثیر ممانتین و سدیم والپروات در پروفیلاکسی

سردردهای میگرنی

استاد راهنما:

دکتر وحید عباسی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل عطallo

دکتر افشار شرقی

نگارش:

میثاق پوردنیا

زمستان 1397

شماره پایان نامه:

0717

:IRCT

IRCT20180624040229N1

تشکر و قدردانی

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه آفرید برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه‌ی پدیده‌های علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما عنایت فرمود. اکنون که باید آغازی بر یک پایان بنگارم بر خود لازم می‌دانم که از استاد محترم جناب آقای دکتر وحید عباسی بخاطر راهنمایی‌های ارزنده شان در راستای انجام این پروژه نهایت تقدير و تشکر را نمایم. در اینجا لازم می‌دانم از زحمات استاد گرامی جناب آقای دکتر ابوالفضل عطالو و سرکارخانم دکتر افshan شرقی بخاطر کمک‌های ارزشمند قدردانی نمایم.

تقدیم

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم
ساخته تا در سایه‌ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه‌ی
آنها شاخ و برگ گیرم واز سایه‌ی وجودشان در راه کسب دین و
دانش بهره گیرم.

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی
است بر بودنم چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار،
مايه هستی ام بوده اند، دستم را گرفتند و در این وادی پر فراز و
نشیب زندگی ، چگونه راه رفتن را به من آموختند.

آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.

حال این برگ سبزی است تحفه‌ی درویش تقدیم به آستان
آنان.....

مقایسه تاثیر ممانتین و سدیم والپروات در پروفیلاکسی سردردهای میگرنی

چکیده

سابقه و هدف: سدیم والپرات یک داروی ضد تشنج و ثابت کننده خلق است که جهت پیشگیری سردردهای میگرنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم تاثیر و کارایی این دارو، برخی بیماران دارو را به دلیل عوارض آن تحمل نمی‌کنند. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی ممانتین با عوارض کمتر در مقایسه با سدیم والپرات در پیشگیری از سردردهای میگرنی است.

مواد و روش ها: در این مطالعه بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب کلینیک‌های کوثر و کلینیک رویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه به صورت دوسوکور انجام شد به طوری که 80 بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه زیر قرار گرفتند (هر گروه 40 بیمار) : 1- گروه ممانتین 2- گروه والپروات سدیم بیماران هر گروه پس از 12 هفته مصرف داروی خود به مدت 4 هفته هیچ دارویی مصرف نکردند و بعد از آن به مدت 12 هفته به بیماران گروه ممانتین، سدیم والپروات و به بیماران گروه سدیم والپروات، ممانتین داده شد.. در این مدت، شدت سردرد، مدت سردرد، تعداد دفعات بروز سردرد، عوارض جانی و میزان استفاده از داروهای مسکن در هنگام حمله حاد میگرن توسط بیماران در یادداشت‌های روزانه ثبت شد اطلاعات مربوطه جمع آوری و تحت ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: دو داروی سدیم والپروات و ممانتین در کل بیماران باهم مقایسه شدند که تاثیر این دو دارو در طول مدت 6 ماهه درمان نشان داد که از نظر فرکانس و شدت سردرد و نمره MIDAS تفاوت معنی داری از لحاظ تاثیر دو دارو وجود دارد.

نتیجه گیری: داروی سدیم والپروات تاثیرات بهتری در بهبودی بیماران نسبت به ممانتین دارد.

کلمات کلیدی: ممانتین، سدیم والپروات، میگرن

فهرست مطالعه

فصل اول: طرح تحقیق	فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه	1-1 مقدمه
2-1 بیان مساله	2-1 بیان مساله
3-1 تعریف واژه ها	3-1 تعریف واژه ها
4-1 اهداف	4-1 اهداف
4-1-1 هدف کلی مطالعه	4-1-1 هدف کلی مطالعه
4-1-2 اهداف اختصاصی	4-1-2 اهداف اختصاصی
4-1-3 سوالات/فرضیات	4-1-3 سوالات/فرضیات
فصل دوم: پیشینه تحقیق	فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 میگرن	2-1 میگرن
2-1-1 طبقه بندی میگرن	2-1-1 طبقه بندی میگرن
2-1-2 میگرن بدون اورا	2-1-2 میگرن بدون اورا
2-1-3 میگرن با اورا	2-1-3 میگرن با اورا
2-1-4 میگرن مزمن	2-1-4 میگرن مزمن
2-1-5 میگرن عارضه دار	2-1-5 میگرن عارضه دار
2-1-6 سندروم های دوره ای که ممکن است با میگرن در ارتباط باشند	2-1-6 سندروم های دوره ای که ممکن است با میگرن در ارتباط باشند
2-1-7 یافته های فیزیکی طی حمله میگرن	2-1-7 یافته های فیزیکی طی حمله میگرن
2-1-8 یافته های آزمایشگاهی	2-1-8 یافته های آزمایشگاهی

ror! Bookmark not defined.	9-1-2 پاتوژن میگرن
ror! Bookmark not defined.	10-1-2 تشخیص میگرن
ror! Bookmark not defined.	11-1-2 درمان میگرن
ror! Bookmark not defined.	12-1-2 سدیم والپرات
ror! Bookmark not defined.	2-بررسی متون
ror! Bookmark not defined.	فصل سوم: شیوه اجرای تحقیق
ror! Bookmark not defined.	3-1 نوع مطالعه
ror! Bookmark not defined.	3-2 معیارهای ورود و خروج
ror! Bookmark not defined.	3-3 روش نمونه گیری
ror! Bookmark not defined.	3-4 روش گردآوری اطلاعات
ror! Bookmark not defined.	3-5 ملاحظات اخلاقی
ror! Bookmark not defined.	3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
ror! Bookmark not defined.	3-7 جدول متغیر ها
ror! Bookmark not defined.	فصل چهارم: نتایج
ror! Bookmark not defined.	4-1 نتایج
ror! Bookmark not defined.	4-2 دامنه تغییرات و میانگین سنی بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-3 طول مدت ابتلا به میگرن در بیماران مورد مطالعه
ror! Bookmark not defined.	4-4 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه قبل از تجوییر دارو
ror! Bookmark not defined.	4-5 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه بعد از تجوییر دارو
ark not defined.	4-6 مقایسه فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه قبل و بعد از تجوییر دارو

7-1-4 دوره ای 4 هفته ای پاک سازی	error! Bookmark not defined.
8-1-4 میزان مصرف NSAID	جهت کنترل سردرد در دوره ای 4 هفته ای پاک سازی
9-1-4 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه پس از کراس.	error! Bookmark not defined.
10-1-4 مقایسه فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه پس از کراس.	Bookmark not defined.
11-1-4 مقایسه گروه A در سه ماهه اول و سه ماهه دوم	error! Bookmark not defined.
12-1-4 مقایسه گروه B در سه ماهه اول و سه ماهه دوم	error! Bookmark not defined.
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری	error! Bookmark not defined.
5-1 بحث	error! Bookmark not defined.
5-2 نتیجه گیری	error! Bookmark not defined.
5-3 محدودیت ها	error! Bookmark not defined.
5-4 پیشنهادات	error! Bookmark not defined.
منابع	error! Bookmark not defined.
پیوست ها	error! Bookmark not defined.
پیوست 1	error! Bookmark not defined.
پیوست 2 فرم MIDAS	error! Bookmark not defined.

فهرست جداول

- جدول 4-1-1 فراوانی جنس در بیماران مورد مطالعه به تفکیک دو گروه.....31
- جدول 4-1-2 دامنه تغییرات و میانگین سنی بیماران.....32
- جدول 4-1-3 طول مدت ابتلا به میگرن در بیماران مورد مطالعه.....33
- جدول 4-1-4 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه قبل از تجوییر دارو.....34
- جدول 4-1-5 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه بعد از تجوییر دارو.....36
- جدول 4-1-6 مقایسه فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه قبل و بعد از تجوییر دارو.....37
- جدول 4-1-7 دوره‌ی 4 هفته‌ای پاک‌سازی.....38
- جدول 4-1-8 میزان مصرف NSAID جهت کنترل سردرد در دوره‌ی 4 هفته‌ای پاک‌سازی.....39
- جدول 4-1-9 فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه پس از کراس.....40
- جدول 4-1-10 مقایسه فرکانس، مدت، شدت سردرد و نمره MIDAS در دو گروه پس از کراس.....41
- جدول 4-1-11 مقایسه گروه A در سه ماهه اول و سه ماهه دوم.....42
- جدول 4-1-12 مقایسه گروه B در سه ماهه اول و سه ماهه دوم.....43
- جدول 4-1-13 مقایسه گروه سدیم والپروات در کل طول مدت درمان.....44
- جدول 4-1-14 مقایسه گروه ممانتین در کل طول مدت درمان.....45
- جدول 4-1-15 مقایسه تاثیر دو داروی سدیم والپروات و ممانتین در کل دوره درمان.....46

فهرست علایم اختصاری

FDA: food and drug administration

GABA: gamma aminobutyric acid

I.H.S: international headache society

