

سیده



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت درجه مقطع دکترای حرفه‌ای عمومی پزشکی

عنوان

مقایسه اثر داپوکستین، پاروکستین، درمان ترکیبی
داپوکستین تادالافیل و درمان ترکیبی پاروکستین
تادالافیل در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

استاد راهنما

دکتر علی حسین خانی

استاد مشاور

دکتر فیروز امامی

دکتر حامد محسنی راد

نگارنده

نیما سلوکی

زمستان ۱۳۹۸

شماره پایان نامه

۰۷۹۱

تقدیم

این پایان نامه را با افتخار تقدیم می کنم به محضر استاد "یارگوس لاتیموس" که در بدبعت، فضاسازی و خلق اثار بدیع بی مانند هستند.

سپاسگزاری

از زحمات استاد ان ارجمند :

جناب آقای دکتر علی حسین خانی که در تمام مراحل پایان نامه دلسوزانه و با سعه صدر در رفع موانع و مشکلات یاریگر من بودند

جناب آقای دکتر فیروز امانی و که در مراحل مختلف انجام رساله از تجربیات و دانش ایشان بهره‌مند شدم

جناب آقای دکتر حامد محسنی‌راد که با راهنمایی ها و پیگیری های ارزنده خود روشنگر راه اجرای تحقیق بودند و با مشاوره های راهگشای خود بندۀ را در مسیر همراهی نمودند

از استاد مهریان دکتر ولی زاده ، استاد بزرگوار دکتر فیضی و دکتر عیسی زده که با صرف وقت ارزشمندانه زحمت داوری این پایان نامه را به عهده داشته اند سپاسگذارم

از استاد دلسوز خانم دکتر ظیریان که حل مشکلات و موانع بوجود امده را برایم آسان کردنده نهایت تشکر را دارم

از پدر و مادر عزیزم و برادر مهریانم که در طول سال های تحصیلی همیشه نا امیدی ها و بد خلقی هایم را به امیدواری و مهریانی تبدیل کردند و همیشه برقوت قلب و تلاشم افزودند سپاسگذارم

از دوست گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا سمنانی و سایر دوستان دلسوزم نهایت تشکر را دارم

از همکلاسی های عزیزم (نه همه شان) که در این هفت سال همراهم بودند تشکرم و ارزوی توفيق برایشان دارم

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: طرح تحقیق	
۱-۱ مقدمه و بیان مسئله.....	۲
۱-۲ تعریف واژه‌ها.....	۴
۱-۳ اهداف پژوهش.....	۵
۱-۳-۱ هدف کلی.....	۵
۱-۳-۲ اهداف اختصاصی.....	۵
۱-۳-۳ اهداف کاربردی.....	۵
۱-۳-۴ فرضیات یا سؤالات تحقیق.....	۶
فصل دوم: بررسی متون	
۲-۱ مبانی نظری.....	۸
۲-۱-۱ انزال زودرس.....	۸
۲-۱-۲ مکانسیم انزال.....	۱۰
۲-۱-۳ اپدمیولوژی.....	۱۰
۲-۱-۴ درمان.....	۱۱
۲-۱-۴-۱ درمان دارویی.....	۱۲
۲-۲ مطالعات مشابه.....	۱۶
فصل سوم: روش تحقیق	
۳-۱ مقدمه.....	۲۲
۳-۲ نوع مطالعه.....	۲۲
۳-۳ محیط پژوهش.....	۲۲
۳-۴ جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه.....	۲۳
۳-۵ روش تعیین حجم نمونه.....	۲۳

۲۳	۳-۶ معیار های ورود به مطالعه
۲۳	۳-۷ معیار های خروج از مطالعه
۲۴	۳-۸ روش انتخاب تصادفی نمونه ها
۲۴	۳-۹ روش انجام مطالعه
۲۵	۳-۱۰ متغیر های مورد بررسی
۲۶	۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی
۲۶	۳-۱۲ آنالیز آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۲۹	۴-۱ اطلاعات دموگرافیک
۳۰	۴-۲ یافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۴۰	۵-۱ بحث
۴۵	۵-۲ نتیجه گیری
۴۶	۵-۳ محدودیت ها
۴۷	۵-۴ پیشنهادها
۴۸	منابع

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۳-۱ متغیرهای مورد بررسی.....	۲۵
جدول ۱-۴ فراوانی و میانگین گروههای سنی.....	۲۹
جدول ۲-۴ مقایسه‌ی مدت‌زمان انزال (IELT) در بین گروههای موردمطالعه در زمان‌های مختلف.....	۳۰
جدول ۳-۴ مقایسه تعداد رابطه در هفته (Sex Frequency) در گروههای موردمطالعه به تفکیک زمان.....	۳۲
جدول ۴-۴ مقایسه گروههای دارویی از نظر عوارض جانبی در دو هفته بعد از درمان.....	۳۴
جدول ۵-۴ مقایسه گروههای دارویی از نظر عوارض جانبی در چهار هفته بعد از درمان.....	۳۵
جدول ۶-۴ مقایسه گروههای مختلف دارویی بر اساس مدت‌زمان انزال (IELT) در گروه سنی ۲۰-۳۰ ساله.....	۳۶
جدول ۷-۴ مقایسه گروههای مختلف دارویی بر اساس مدت‌زمان انزال (IELT) در گروه سنی ۴۰-۳۱ ساله.....	۳۷
جدول ۸-۴ مقایسه گروههای مختلف دارویی بر اساس مدت‌زمان انزال (IELT) در گروه سنی ۵۰-۴۱ ساله.....	۳۸

فهرست اختصارات

PE.....	Premature Ejaculation
Da.....	Dapoxetine
Pa.....	Paroxetine
DT.....	Combination therapy of dapoxetin/tadalafil
PT.....	Combination therapy of paroxetine/tadalafil
IELT	Intravaginal Ejaculation latency time
ISSM	The International Society for Sexual Medicine
SEG.....	Spinal Ejaculatory Generator
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
PDE5	Phosphodiesterase type 5
SSRI.....	Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
IRCT.....	Iranian Registry of Clinical Trials
PRN	Pro re nata

مقایسه اثر داپوکسیتین، پاروکسیتین، درمان ترکیبی داپوکسیتین تادالافیل و درمان ترکیبی پاروکسیتین تادالافیل در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

چکیده

سابقه و هدف: انزال زودرس یکی از شایع ترین اختلالات جنسی در مردان، حتی افراد سالم محسوب می‌شود انزال زودرس به حالتی اطلاق می‌شود که فاصله زمانی از دخول تا انزال کوتاه باشد و انزال قبل یا در فاصله کوتاهی پس از دخول رخ دهد و یا فرد کترلی بر روی انزال خود نداشته باشد در حال حاضر استفاده از SSRI‌ها و درمان‌های ترکیبی درمان‌های مورد بررسی در درمان زود انزالی هستند این مطالعه با هدف مقایسه داپوکسیتین، پاروکسیتین، درمان ترکیبی داپوکسیتین تادالافیل در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به روش کارازمایی بالینی انجام شد تعداد ۱۲۰ بیمار مبتلا به انزال زودرس مورد بررسی قرار گرفتند بیماران به طور تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند گروه اول قرص داپوکسیتین (Da)، گروه دوم قرص پاروکسیتین (Pa)، گروه سوم قرص پاروکسیتین به همراه قرص تادالافیل (PT) گروه چهارم قرص داپوکسیتین به همراه قرص تادالافیل (DT) به مدت یک ماه مصرف کردند و در ۲ هفته بعد و ۴ هفته بعد از نظر مدت زمان انزال، تعداد رابطه جنسی در هفته و عوارض دارویی مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین سنی در گروه Da $32 \pm 7/9$ سال، گروه Pa $32 \pm 7/2$ سال، گروه PT $31/1 \pm 6/9$ سال و گروه DT $32/9 \pm 7/7$ سال بود. بیشترین مدت زمان انزال در دو و چهار هفته بعد مربوط به گروه Da بوده است. مدت زمان انزال در چهار هفته بعد در گروه‌های Da با $p=0.029$ DT با $p=0.043$ Pa با $p=0.006$ و PT با $p=0.004$ همچنین در دو هفته بعد نیز Da و DT با $p=0.022$ و Pa با $p=0.016$ و DT با $p=0.033$ PT با $p=0.043$ وجود داشته است.

نتیجه گیری: در پژوهش حاضر درمان ترکیبی داپوکسیتین تادالافیل و درمان ترکیبی پاروکسیتین تادالافیل در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس از نظر مدت زمان انزال تاثیر بیشتری نسبت به درمان‌های تک دارویی داشت و همچنین این رژیم‌های درمانی باعث بروز عوارض دارویی بیشتری نیز می‌شوند.

کلمات کلیدی: زود انزالی، پاروکسیتین، سیلدنافیل، داپوکسیتین