

مجموعه چکیده مقالات



دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد علوم پزشکی اردبیل

اولین کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

۲۵-۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پرستاری و مامانی

سلامت جنسی زوجین در بحران کووید ۱۹

پوران اخوان اکبری، استادیار گروه مامانی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران Email: akhavanakbari@yahoo.com

زمینه و هدف: شیوع بیماری کووید ۱۹، یا تغییر در روابط بین فردی، زندگی در اجتماع و سلامت جنسی، به طور چشم‌گیری کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. روابط جنسی بخش عادی از زندگی زوجین هست و تصمیم‌گیری در این مورد نیازمند برقراری تعادل بین سلامت شخصی و عصومی افراد است. در فوریت‌های مختلف پیدا شده و بحران‌ها نیاز به روابط جنسی پایدار وجود دارد و برای ارتقاء سلامت جنسی و روانی زوجین، استراتژی‌های کاهش آسیب به فرد و شریک جنسی پایدار مد نظر قرار گیرد؛ هدف مطالعه مورثی حاضر، ارائه توصیه‌هایی بر اساس شواهد موجود برای کمک به زوج‌ها در مواجهه با زندگی جنسی خود در این دوره حساس است.

روش کار: مطالعه مورثی حاضر بر اساس جستجوی مقالات موجود در زمینه بیماری کووید ۱۹ و روابط جنسی در موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی Google scholar، PubMed، Scopus، up to date، PubMed scholar، Sex، sexual health، sexual behavior، couples، covid-19، انجام گرفت و مطالعات به دست آمده طبق معیارهای پژوهشی مد نظر انتخاب شدند.

یافته‌ها: حقظ رابطه جنسی سالم در بحران کووید ۱۹ و دوران قرنطینه که زوج‌ها زمان بیشتری را در خانه و در ارتباط با هم می‌گذرانند، از ضروریات سلامت روان و سلامت جنسی برای زوجین است. رابطه جنسی بخش طبیعی از زندگی و روابط زوجی است که باید با رضایت طرقین انجام گیرد. در طی اوزراس گسترده سلامت عمومی نیز رابطه جنسی پایدار انجام شود و با استفاده از استراتژی‌های صحیح، کاهش خطر برای فرد و شریک جنسی مد نظر قرار گیرد. اکثر زوج‌ها به دلیل ترس از انتقال بیماری، روابط نزدیک خود با پارتner را محدود و با منع می‌کنند که می‌تواند تعابات جسمانی و روانی متعددی داشته باشد. راهکارهایی برای کاهش خطر انتقال کووید ۱۹ و لذت بردن از رابطه جنسی وجود دارد. در گام اول زوج‌ها باید از عالم بیماری و روش‌های انتقال بیماری کووید ۱۹ و نیز پیشگیری از انتشار بیماری آگاه شده و مراقبت‌های لازم را به کار بگیرند. ویروس از طریق ذرات موجود در بیان، مخاطب یا تنفس افراد مبتلا به کووید ۱۹، حتی در افراد بدون علامت، گسترش می‌یابد. ویروس در منی و مدفوع افراد مبتلا به COVID-19 نیز یافت شده است. اطلاعات برای بیان قطبیت انتشار از طریق رابطه جنسی محدود است و رابطه جنسی روشی رایج برای گسترش COVID-19 نیست. اما احتمال انتقال بیماری از طریق تماس نزدیک شرکای جنسی، بوسیلهن و از راه تنفس باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به توصیه CDC برای رعایت فاصله فیزیکی ۶ فوت، مراقبت در حین رابطه جنسی شامل استفاده از موقعیت‌های جنسی که تماس نزدیک و چهره را به حداقل می‌رسانند و اجتناب از رابطه دهانی یا با استفاده از کاتنوم توصیه می‌شود. اما کاتنوم‌ها به تنهایی برای محافظت در برابر COVID-19 کافی نیستند. شتن دست‌ها حداقل ۲۰ ثانیه قبل و بعد از رابطه جنسی باید انجام شود. اگر یکی از زوج‌ها بیماری پیشکی زمینه‌ای نظری آسم، بیماری فلئی، دیابت، چاقی، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، سرطان با سیستم ایمنی ضعیف داشته باشد، در این صورت برخی زوجین اجتناب از رابطه جنسی را ترجیح می‌دهند. افراد بیهوشی‌باخته از بیماری نیز در صورتی که ده روز از شروع علائم گذشته باشد یا حداقل سه روز بدون تب باشند، به احتمال زیاد دیگر عفونی و عامل انتشار بیماری نیستند.

نتیجه‌گیری: برقراری رابطه جنسی با همسر در دوران همه‌گیری COVID-19 نیازمند توجهات خاصی است و با توجه به اینکه برخی از افراد الوده به covid-19 هرگز علائم نشان نمی‌دهند، راهکارهای پیش‌گیری از انتشار بیماری در روابط زوجی باید مد نظر قرار گیرد. اگر هر کدام از زوجین احساس خوبی نداشته باشند، می‌توانند از رابطه جنسی اجتناب و روش جایگزین برای آن انتخاب کنند.

واژه‌های کلیدی: sexual health, COVID-19, couples, sexual function