



مجموعه چکیده مقالات

اولین کنگره ملی سیمای سلامت خانواده



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

۲۵-۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پرستاری و مامایی

تأثیر ناباروری بر میزان خشونت جنسی در زنان نابارور

فاطمه سلطانیان^{*}، پوران اخوان اکبری^{*}، ستو رزازع^{*}

^{*}دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

Email : Fatemesoltanian1378@gmail.com

اعضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمینه و هدف : خشونت علیه زنان تهدیدی جدی برای سلامتی و حقوق انسانی آنان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد میزان خشونت در زنان نابارور بیش از سایر زنان باشد. خشونت علیه زنان غیرارت است از هر نوع اقدام خشونت‌آمیز جنسیتی که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی در زنان شده و یا باعث محرومیت اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی زن می‌گردد. به نظر می‌رسد، بسیاری از خشونت‌های افهار نمی‌شوند و آکثر موارد آن توسط تیمهای پزشکی شناسایی نمی‌گرددند. از عوارض مرتبط با خشونت جنسی می‌توان اختلال استرس پس از سانجه، درد و خارش در ناحیه تناسلی، خونریزی مقدی با مهبلی، اشکال در راه رفت و نشتن و انواع مشکلات روانی مانند تنهایی، افسردگی، خودکشی و دگرگشی را نام برد. با توجه به اینکه نزخ ناباروری در ایران بالا بوده، مطالعه ناباروری با تکیه بر جنبه‌های روانی و اجتماعی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این پژوهش، شناخت عوامل خطر احتمالی است تا در جهت کاهش میزان بروز خشونت جنسی و کمک به ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی جنسی زنان نابارور گامی هر چند اندک برداریم.

روش کار : پژوهش حاضر یک مطالعه موری سیستماتیک است که با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از جمله PubMed، Elsevier, Google scholar, Science Direct زمانی ۱۵ تا ۲۰۲۰ انجام شده است. در نهایت ۱۲ مقاله مرتبط استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها : در مطالعه مقطعی تحلیلی که با مشارکت ۴۰۰ زن (۲۰۰ مورد و ۲۰۰ شاهد) مراجعه‌کننده به مراکز آموزشی درمانی الزهرای شهر رشت در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت؛ میزان خشونت جنسی در زنان نابارور ۶۰ درصد و در زنان بارور، ۳۵/۵ درصد دیده شد که به طور معناداری در گروه نابارور بیشتر بود ($P<0.0001$).

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نتیجه‌گیری : یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که زنان نابارور مورد خشونت جنسی بیشتری قرار می‌گیرند. با توجه به میزان بالای خشونت جنسی، میزان غربالگری خشونت در تماسی مراکز بهداشتی و درمانی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی : خشونت جنسی، ناباروری، زنان