


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشکده پرديس خودگردان

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای دندانپزشکی

عنوان

بررسی وضعیت پریدونتال در افراد با و بدون پسونیازیس

استاد راهنما

دکتر ایلناز فرهودی

استاد مشاور

دکتر مجید رستمی مقدم

نگارش

میلاد ایمانزاده

اسفند ۱۳۹۹

شماره پایان نامه: د/پ/۲۶-۰

سوگندنامه

اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتري دندانپزشکی را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و مسئولیت خدمت به خلق را برعهده گرفته‌ام در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادرمتعال که دانای آشکار و نهان است، و نامش آرامش دل‌های خردمندان و یادش شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس‌دینی را محترم شمارم.

ازتضییع حقوق بیماران پرهیزم و سلامت و بهبود آنان را برمنافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم، در معاینه و معالجه، حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود جز به ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که با پرهیزکاری و شرافت و اخلاق پزشکی منافات دارد اجتناب ورزم، همواره برای ارتقاء دانش پزشکی خویش تلاش کنم و از دخالت در اموری که آگاهی و مهارت لازم را

در آن ندارم خودداری نمایم. در امر بهداشت،
اعتلاء فرهنگ و آگاهی‌های عمومی تلاش
نمایم و تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را
مسئولیت اساسی خویش بدانم.

تقدیر و تشکر

از استاد ارجمند سرکارخانم دکتر ایلناز فرهودی
که در تمام مراحل راهنما و همراه انجام این
پایان نامه بوده‌اند.

از استاد مشاور جناب آقای دکتر مجید رستمی
مقدم

به دلیل راهنمایی‌ها و مشاوره‌های مهم و بدون
نقص ایشان

از اساتید محترم دانشکده دندانپزشکی
از کلیه همکاران و دست‌اندرکاران تحقیق

بررسی وضعیت پریدونتال در افراد با و بدون پسونیازیس

چکیده

مقدمه

بیماری پسونیازیس یک بیماری پاپولواسکاموس التهابی مزمن با اتیولوژی نامعلوم است. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت پریدونتال در افراد با و بدون پسونیازیس بود.

مواد و روشها

در این مطالعه مورد شاهدهی که در مرکز درمانی و آموزشی امام رضا اردبیل انجام گرفت، ۴۷ بیمار مبتلا به پسونیازیس با سن بالای ۱۶ سال و دارای حداقل ۱۲ دندان (گروه بیمار) و ۴۷ فرد سالم از دوستان و همراهان بیمار (گروه کنترل) که فاقد بیماری پسونیازیس یا بیماریهای سیستمیک (دیابت، سیگاری و...) و عدم درمان پریدونتال در ۶ ماه گذشته انتخاب شدند. بررسی وضعیت پریدونتال در بیماران هر دو گروه با اندازه گیری شاخص های PI، CAL، BOP، PD انجام گرفته و ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط آزمونهای تی تست و در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ تحلیل گردید.

نتایج

عمق پروبینگ (PD) در گروه پسونیازیس ($3/27 \pm 1/18$) بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم ($2/74 \pm 0/73$ میلی متر) است. حد چسبندگی کلینیکی (CAL) در گروه پسونیازیس ($8/86 \pm 2/22$) بطور معنی داری کمتر از افراد سالم ($9/29 \pm 1/9$ میلی متر) می باشد. خونریزی حین پروبینگ (BOP)، در گروه پسونیازیس ($63/8$ درصد) بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم ($44/7$ درصد) بود. شاخص پلاک (PI) در گروه پسونیازیس ($42/6$ درصد) مشابه با افراد سالم ($38/3$ درصد) بود.

نتیجه گیری:

ارتباط معنی داری بین بیماری پریدونتال و پسونیازیس وجود دارد.

واژه های کلیدی:

پسونیازیس ، پریدونتال ، ریسک فاکتور

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

2.....عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۴

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- تعریف واژه ها ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ۸

۱-۴-۳- هدف کاربردی ۸

۱-۴-۴- فرضیات تحقیق ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مبانی نظری ۱۰

۲-۱-۱- پسوریازیس ۱۰

۲-۱-۲- انواع پسوریازیس ۱۲

۲-۱-۳- علائم پسوریازیس ۱۳

۲-۱-۴- علت ابتلا به پسوریازیس ۱۴

۲-۱-۵- تشخیص پسوریازیس ۱۵

۲-۱-۶- محرک های پسوریازیس ۱۶

۲-۲- مبانی عملی تحقیق (پیشینه تحقیق) ۱۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- نوع پژوهش ۲۴

۳-۲- جمعیت مورد مطالعه ۲۴

۳-۳- روش نمونه گیری ۲۴

۳-۴- روش انجام تحقیق ۲۵

۳-۵- ملاحظات اخلاقی ۲۶

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۶

فصل چهارم: نتایج (یافته‌های پژوهش)

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

منابع ۳۹

منابع ۴۰

ضمائم ۴۴

فهرست جداول

- جدول ۴-۱- مقایسه فراوانی زنان و مردان در دو گروه ۲۸
- جدول ۴-۲- مقایسه میانگین سنی در دو گروه ۲۸
- جدول ۴-۳- آزمون کلوموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نحوه توزیع داده های PD, CAL ۲۹
- جدول ۴-۴- تعیین مقادیر PD, CAL در گروه بیماران پسوریازیس ۳۰
- جدول ۴-۵- تعیین فراوانی وجود و عدم وجود BOP, PI در گروه بیماران پسوریازیس ۳۰
- جدول ۴-۶- تعیین مقادیر PD, CAL در گروه افراد سالم ۳۱
- جدول ۴-۷- تعیین فراوانی وجود و عدم وجود BOP, PI در گروه افراد سالم ۳۱
- جدول ۴-۸- مقایسه مقادیر PD و CAL در گروه پسوریازیس و سالم ۳۲
- جدول ۴-۹- مقایسه فراوانی وجود و عدم وجود BOP, PI در گروه پسوریازیس و سالم ۳۳

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- مقایسه مقادیر PD و CAL در گروه پسوریازیس و سالم ۳۲

نمودار ۴-۲- مقایسه فراوانی وجود و عدم وجود BOP, PI در گروه پسوریازیس و سالم ۳۳