

تأثیر نمایش روانی(سایکودrama) بر افسردگی زنان بستری مبتلا به اختلال روانی با سیر طولانی

ابوالفضل رهگوی(MSc)^{*}، فاطمه ابراهیمی بلیل(MSc)^{**}، حمیدرضا خانکه(PhD)^{***}، مهدی رهگذر(PhD)^{****}، امید رضایی(MD)^{*****}

*- کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روانی و روانپرستاری - مرتبی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
**- کارشناس ارشد روانپرستاری.

***- استادیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

****- استادیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

*****- استادیار روانپژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

چکیده

● زمینه و هدف: در طول سه دهه اخیر مراقبت از بیماران روانی مزمن در نظام بهداشت روانی مورد توجه فزاینده بوده است. این تحقیق جهت تعیین تأثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان افسردگی زنان بستری مبتلا به اختلال روانی مزمن انجام گرفته است.

● مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بوده که در مرکز آموزشی، درمانی، روانپژوهشی رازی تهران انجام گردیده است. جامعه پژوهش شامل بیماران روانی مزمن زن بستری در آن مرکز بوده که از بین آنها سی بیمار روانی مزمن زن واجد معیارهای ورودی پژوهش انتخاب، و به روش تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تخصیص یافتند. سپس افسردگی آنان توسط پرسشنامه افسردگی یک ارزیابی شد آنگاه ۱۲ جلسه نمایش روانی گروهی برای گروه مداخله اجرا گردید و گروه کنترل برنامه مراقبتی معمول را دریافت کردند. پس از اتمام مداخله افسردگی بیماران مجددًا اندازه گیری شد و داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی مستقل، تی زوجی، کولموگروف اسمیرنوف، کای اسکوئر، لون و آنالیزکوواریانس تحلیل گردید.

● یافته‌ها: میانگین افسردگی قبل و بعد از اجرای نمایش روانی در گروه کنترل معنی دار نبود ولی در گروه مداخله معنی دار بود($p=0/000$) همچنین در بین دو گروه پس از انجام مداخله اختلاف میانگین میزان افسردگی معنی دار شد($P=0/000$) مقایسه میانگین افسردگی پس از اجرای نمایش روانی حتی پس از تعدیل اثر سن و افسردگی قبل از مداخله با استفاده از آنالیز کوواریانس در دو گروه اختلاف معنی دار نشان داد. ($p=0/000$)

● نتیجه‌گیری: اجرای نمایش روانی گروهی سبب کاهش میزان افسردگی در زنان بستری مبتلا به اختلال روانی مزمن شود.

● کلید واژه‌ها: سایکودrama(نمایش روانی)، افسردگی، اختلال روانی مزمن.

*- نویسنده مسئول: تهران-اوین-بلوار دانشجو-خ کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه پرستاری
e-mail: rahgou@uswr.ac.ir

تلفاکس: محل کار ۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۳۶

می‌دهد(۱). در حال حاضر چهل میلیون نفر در سراسر جهان از اختلالات شدید روانی رنج می‌برند و بیش از نود درصد جمعیت کشورهای در حال رشد عملاً از هیچ گونه مراقبت بهداشت روانی بهره

● مقدمه

بیماری‌های روانی مزمن اختلالاتی نامعلوم، مزمن، با دوره‌های تکرار شونده و علایم روانی هستند که عملکرد شخص را شدیداً تحت تأثیر قرار

رضائیان ضمن انجام تحقیقی با عنوان بررسی فواید سایکو دراما در کاهش میزان افسردگی بیماران افسرده مرد دریافت که کاربرد سایکو دراما همراه با سایر درمانهای افسردگی موجب کاهش بیشتر میزان افسردگی می شود^(۹) و نیز ترکیب نمایش روانی گروهی با سایر روان درمانی‌ها نیز باعث کاهش میزان افسردگی می شود که مؤید آن تحقیق ادغام سایکودrama و شناخت درمانی در درمان افسردگی است که توسط حمام سی^۱ در ترکیه صورت گرفته و نشان داده است که میزان افسردگی در بیماران افسرده ای که این دو روش را با هم دریافت کرده بودند کاهش بیشتری داشته است.^(۸)

با توجه به تحقیقات ذکر شده و اثبات مؤثر بودن روش‌های درمانی ترکیبی به نظر می‌رسد که نمایش روانی می‌تواند به عنوان روشی مجزا یا به صورت ترکیبی با سایر روش‌های درمانی در درمان بیماریهای روانی مزمن و عوارض ناشی از آن و بهبود این بیماران مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر اجرای نمایش گروهی بر میزان افسردگی زنان بستری مبتلا به اختلال روانی مزمن انجام گرفته است.

● مواد و روش‌ها

این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی^۲ است که به منظور تعیین تأثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان افسردگی زنان بستری مبتلا به اختلال روانی مزمن در مرکز روانپزشکی رازی در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ انجام گرفت. تعداد سی بیمار روانی مزمن زن واجد معیارهای ورودی پژوهش، انتخاب و به روش بلوك‌های تبدیل تصادفی^۳ به دو گروه کنترل و مداخله تخصیص یافتند. واحدهای پژوهش از بخش‌های فارابی بلوكهای سه و چهار(بخش‌های

ای نمی‌برند^(۲)). بر طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱ حدود بیست و پنج درصد از ناتوانیها در کشورهای پیشرفته را اختلالات روانی تشکیل می‌دهد و ناتوانی بر روی خانواده و جامعه تأثیر می‌گذارد^(۳).

این بیماری‌ها علاوه بر مشکلات مستقیم ناشی از بیماری دارای عوارض همراه نیز هستند که یکی از شکایتها، افسردگی می‌باشد و همراهی افسردگی با این بیماریها به ویژه اسکیزوفرنی را حدود ۲۵ درصد و در افراد عادی ۵ درصد اعلام کرده‌اند^(۴). افسردگی از نظر عوارض جسمانی متعاقب، برحسب روزهای بستری شدن و آشتفتگی جسمانی، در مرتبه دوم و پس از بیماریهای قلبی پیشرفته قرار دارد^(۵).

افسردگی درمان نشده در این بیماران می‌تواند منجر به درمان ضعیف سایر حالت‌های پزشکی مثل افزایش طول مدت بستری و افزایش مرگ و میر و غیره شود. از طرفی درمان افسردگی همراه با سایر بیماریها به سبب تعدد علایم و مشکلات تشخیصی، زمان بر و مشکل می‌باشد و نیاز به دوره طولانی درمانی دارد^(۳). مداخلات روان درمانی هدف اولیه درمانی در نظر گرفته می‌شود. به علت اینکه داروهای ضد افسردگی به کار گرفته شده در این همراهی ممکن است با سایر داروهای مرتبط با بیماریهای داخلی تداخل داشته باشد^(۴).

درمان‌های منفرد در این همراهی نتایج ضعیفی نسبت به روان درمانی‌های همراه داشته اند. لذا روش‌های درمانی مختلفی از جمله روان درمانی، دارودرمانی، ترکیبی از دو روش فوق، سایر روش‌ها مثل شوک درمانی را طلب می‌کند^(۶). از جمله روان درمانی‌های مورد استفاده در درمان بیماران مزمن روانی نمایش روانی است که به عنوان آمیزه‌ای از روان درمانی و آموزش مهارت‌های اجتماعی، نمایش مشکلات روانی، اجتماعی در نظر گرفته می‌شود^{(۷) و (۸)}.

1. Hamamcy.

2. Semi Experimental.

3. Randomized Permuted Blocks.

توزیع میانگین میزان افسردگی قبل و بعد از مداخله و نرمال بودن توزیع میانگین سن، طول مدت بستره، طول مدت تشخیص بیماری و تفاضل میانگین افسردگی قبل و بعد از مداخله بیماران روانی مزمن استفاده شد.

● یافته‌ها

یافته‌ها نشان داد که مقطع تحصیلی ابتدایی با ۶۰٪ در گروه کنترل و مقطع راهنمایی با ۴۰٪ در گروه مداخله بیشترین درصد را دارا بودند. بیشتر افراد متأهل با ۶۰٪ در گروه مداخله و بیشتر مجردها با ۶۰٪ در گروه کنترل قرار داشتند. میانگین سن در گروه مداخله 23 ± 6 و در گروه کنترل 23 ± 7 بوده که اختلاف معنی داری نداشتند($p=0.416$). میانگین طول مدت بستره در گروه مداخله 24 ± 2 سال و در گروه کنترل 20 ± 2 سال به ترتیب 69 ± 33 سال می‌باشد و مقایسه نشان می‌دهد دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند($p=0.220$).

میانگین طول مدت بیماری روانی در گروه مداخله 86 ± 2 سال و در گروه کنترل دارای میانگین 80 ± 2 سال می‌باشد و دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند($p=0.942$) دو گروه از نظر متغیرهای میزان تحصیلات، وضعیت تأهیل، سن، طول مدت بستره و طول مدت تشخیص بیماری همسان بودند($p<0.05$). (جدول ۲).

یافته‌ها اختلاف معنی دار آماری در میزان افسردگی قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله را نشان دادند($p=0.000$). (جدول ۲).

نتایج مربوط به یافته‌های بین گروهی نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین میزان افسردگی بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل می‌باشد($p=0.000$). (جدول ۳).

نتایج نشان می‌دهد که حتی پس از تعدیل اثر سن و میزان افسردگی قبل از مداخله اختلاف معنی دار آماری بین میزان افسردگی واحدهای پژوهش

بستری بیماران مزمن زن) در این مرکز انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک و فرم اطلاعات دموگرافیک بوده است.

این طرح با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی ذیل انجام گردید:

۱- گرفتن رضایتname از خانواده بیماران یا قیم آنها. ۲- توضیح به خانواده بیماران و خود بیماران درخصوص اینکه هر زمانی که بخواهند می‌توانند از گروه انصراف بدهند. ۳- شرکت داوطلبانه و آگاهانه واحدهای پژوهش. ۴- تذکر این نکته که اطلاعات کسب شده از بیماران کاملاً محرومانه است. ۵- اجرای مداخله بعد از اثبات اثربخشی روش مذکور برای گروه کنترل.

قبل از انجام مداخله میزان افسردگی نمونه‌ها با پرسشنامه افسردگی بک^۱ توسط محقق اندازه گیری شد سپس گروه مداخله تحت ۱۲ جلسه نمایش روانی در جلسه‌های یک ساعته دوبار در هفته به مدت شش هفته قرار گرفتند و گروه کنترل درمانهای معمول^۲ را ادامه دادند. در طول این جلسات علاوه بر ایجاد فرصت برای بیماران جهت بازی در نقش‌های افراد دلخواه یا مورد تنفر و ایجاد موقعیتی برای ابراز تعارضات درونی از تکنیک‌های تسهیل سازی جهت ایجاد تعامل بین افراد، تکنیک تخلیه جهت بیان راحت ذهنیات، تکنیک تبادل نظر برای ایجاد احترام مقابل، جایگزینی، همانند سازی، برون فکنی و غیره نیز استفاده گردید. یک روز بعد از اتمام مداخله میزان افسردگی واحدهای پژوهش در هر دو گروه همانند پیش آزمون اندازه گیری گردید. در نهایت داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهای تی مستقل، آزمون تی با نمونه های وابسته، آزمون کای اسکوئر، لون، روش آنالیز کوواریانس مورد پردازش قرار گرفتند و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن

1. Beck Depression Inventory.

2. Routine Treatments.

قبل و بعد از مداخله در دو گروه وجود دارد ($p=0/000$) (جدول ۴).

● بحث و نتیجه گیری

نتایج آماری پژوهش حاضر کاهش میانگین میزان افسردگی واحدهای پژوهش بعد از اجرای نمایش روانی گروهی در گروه مداخله را نشان داد ($p=0/000$). (جدول ۲) که با نتایج تحقیق رضائیان در سال ۱۳۷۶ تحت عنوان بررسی تأثیر کاربرد سایکودrama در میزان افسردگی بیماران افسرده اساسی که نشان دهنده تأثیر کاربرد سایکودrama همراه با سایر درمانهای افسردگی در کاهش بیشتر میزان افسردگی بود منطبق می باشد (۹).

یافته های مطالعه حاضر هم چنین با نتایج تحقیق حمام سی^۱ در ترکیه در سال ۲۰۰۶ تحت عنوان ادغام سایکودrama و شناخت درمانی در درمان افسردگی که نشان داده است میزان افسردگی در بیماران افسرده ای که دو روش نمایش روانی را همراه با درمانهای معمول دریافت کرده بودند کاهش بیشتری داشته است همخوانی دارد (۸). نیز تحقیق اوگوزان اوغلی در سال (۲۰۰۵) که بر روی ۱۱ مرد سالمند انجام گرفته بود نشان داد که میزان اضطراب و افسردگی در این افراد با انجام ۱۸ جلسه نمایش روانی گروهی کاهش یافته است (۱۰).

ماریا سن در سال ۱۹۹۹ تأثیر روان درمانی سایکودراماتیک همراه با دارودرمانی در اختلال افسردگی اصلی را بر روی بیست بیمار افسرده اساسی سنجید و پس از ۲۴ جلسه روان درمانی در سایکودراماتیک دریافت که این روش درمانی در درمان افسردگی اساسی مؤثر است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد (۱۱).

I. Hamamchy.

جدول(۱) ارزیابی همکنی واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای زمینه ای

حدود اطمینان٪۹۵	حد پایین	حد بالا	نتایج تحلیل آماری	گروه کنترل(n=15)		گروه مداخله(n=15)		رده متغیر یا میانگین	متغیر زمینه ای
				درصد	تعداد	درصد	تعداد		
-	-	p=0/456,df=1,X=2/61	60/0 26/7 6/7 6/7	9 4 1 1	33/3 40/0 20/0 6/7	5 6 3 1	ابتدائی راهنمایی دبیرستان دانشگاه	میزان تحصیلات	
-	-	p=0/466, DF 1,X=1/20	60/0 40/0	9 6	40/0 60/0	6 9	مجرد متأهل	تأهل	
-5/89	3/66	p=0/416df 28, t=0/825	41/07 ± 9/04		38/6 ± 7/23		میانگین	سن	
-2/99	0/72	p=0/22, df=28 t=1/25	8/33 ± 2/69		7/20 ± 2/24		میانگین	طول مدت بستری	
-1/93	1/80	p=0/942 f=28, t=0/825	10/87 ± 2/07		10/80 ± 2/86		میانگین	طول مدت تشخیص	

جدول(۲) مقایسه میانگین افسردگی بیماران روانی مزمن زن بستری در مرکز روانپزشکی رازی قبل و بعد از مداخله در بین دو گروه کنترل و مداخله در سال(۱۳۸۵)

نتایج تحلیل آماری	(n=15)	گروه کنترل	(n=15)	گروه مداخله	وضعیت	متغیر
p=0/633,df=14, t=0/488		29/93 ± 6/76		30 ± 4/24	قبل	افسردگی
p=0/000,df=14, t=13/52		30/60 ± 5/57		20/87 ± 3/76	بعد	

جدول(۳) مقایسه میانگین افسردگی بیماران روانی مزمن زن بستری در مرکز روانپزشکی رازی قبل و بعد از مداخله در درون دو گروه کنترل و مداخله در سال(۱۳۸۵)

نتایج آماری	بعد	قبل	متغیر		وضعیت
			گروه مداخله	n=15	
p=0/000,df=28, t=-5/1	20/87 ± 3/76	30/0 ± 4/24			افسردگی
p=0/974,df=28, =0/03	30/60 ± 5.57	29/93 ± 6/76	n=15	گروه کنترل	

جدول(۴) مقایسه میانگین میزان افسردگی بعد از تعديل اثر میزان افسردگی قبل از مداخله و تعديل اثر سن بیماران روانی مزمن زن بستری در مرکز روانپزشکی رازی (۱۳۸۵)

مقدار احتمال	F	آماره	میانگین مجدورات	درجه آزادی	مجموع مجدورات	مجموع	منبع تغییرات	
							مقدار ثابت	میزان افسردگی قبل از مداخله
0/093	3/05	37/28		1	37/28			
0/000	18/94	231/80		1	231/80			سن
0/430	0/644	16/01		1	16/01			گروه کنترل و مداخله
0/001	13/47	335/02		1	39/22			میزان خطا
0/373	0/824	24/48		24	596/75			
-	-	-		30	21208/00			مجموع

● منابع

۱. شنایی باقر. روان درمانی و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر. ۱۳۸۱.
۲. اردشیرزاده منصوره. بررسی مقایسه ای فشار روانی و راهبردهای مقابله ای در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و مراقبین بیماران دوقطبی.(پایان نامه دکتری) تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳۸۳.
3. Carson R, et al: Abnormal Psychology and Model life, 10th Edition, Longman Company, 2000; 444-83.
4. North West Institute Of Dynamic Psychotherapy. Gaskell House Psychotherapy Center Swanton Manchester England. 2006; 5-14.
5. شفیع آبادی عبدالله. پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات رشد. ۱۳۷۰.
6. Kennedy P H, Iam W, Nutt D J, Ethase M. Treating Depression Effectively: Applying Clinical Guidelines Sidney Psychosomatic 2004: 24.
7. سرداری پور مسلم. بررسی تأثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان اعتماد به نفس بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در مرکز روانپژوهی رازی.(پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳۷۷.
8. Zeynep H. Integrating psychodrama and cognitive behavioral Therapy to treat moderate depression. The Art in psychotherapy 2006; 33: 199-207.
9. Rezaian H. The usefulness of psychodrama in the treatment of Depressed Patients. Indian Journal of Clinical Psychology. 1997; 24(1): 82-8.
10. Oguzhanoglu N, Osman O, The elderly, nursing homes and life Voyages: a psychodrama group study. Available: www Enterz Pub Med. Htm. 2005 summer 16(2): 124-32.
11. Maria Sene costa Elisabeth, Antonio Rosilda, Britto Marcio, de Macedo Soares, Siqulater Rev Bras. Interpersonal Therapy: a brief and focal model. AJN 2006; 1: 40-3.