

The Role of Insertion Sequence (IS) Elements in Inactivation of Outer Membrane Porin OprD and Resistance to Carbapenems among *Pseudomonas aeruginosa* Clinical Strains in Ardabil

Nazari M¹, Ahmadi H¹, Vaez H², Khademi F^{1*}

1. Department of Microbiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.

2. Department of Microbiology, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

* **Corresponding author.** Tel: +984533534684, Fax: +984533534684, E-mail: k_farzad@yahoo.com , f.khademi@arums.ac.ir

Received: Apr 27, 2022 Accepted: May 17, 2022

ABSTRACT

Background & objectives: Carbapenems are the main antibiotics for the treatment of infections caused by multidrug-resistant (MDR) *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*). The aims of this study were to determine the prevalence of gene encoding outer membrane porin protein (OprD) in carbapenem-resistant *P. aeruginosa* strains as well as to assess the role of insertion sequence (IS) elements in the inactivation of OprD porin and the emergence of carbapenem resistance.

Methods: In this study, 103 clinical isolates of *P. aeruginosa* including 58, 42 and 23 strains resistant to imipenem, meropenem, and doripenem were used, respectively. The isolates were collected from patients referred to Ardabil hospitals. The presence of *oprD* gene and IS elements were investigated using polymerase chain reaction (PCR) and sequencing methods. *P. aeruginosa* PAO1 standard isolate was used as the positive control strain for *oprD* gene.

Results: The frequency of *oprD* gene among carbapenem-resistant *P. aeruginosa* strains isolated from Ardabil hospitals was 96.5%. Furthermore, IS elements were not observed in the investigated isolates.

Conclusion: Based on the results of this study, the presence of IS elements did not involve in the inactivation of outer membrane porin OprD and resistance to carbapenems among *P. aeruginosa* clinical strains in Ardabil. Therefore, an investigation of the role of other mutations in reducing the expression of *oprD* gene and increasing *P. aeruginosa* resistance to carbapenems is recommended.

Keywords: *Pseudomonas aeruginosa*; Insertion Sequence; OprD

نقش عناصر توالی الحاقی (IS) در غیرفعال کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت به کارباپنم‌ها در سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در اردبیل

مریم نظری^۱، هادی احمدی^۱، حمید واعظ^۲، فرزاد خادمی^{*}

۱. گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

۲. گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۴۵۳۵۴۶۸۴ - فاکس: ۰۴۵۳۵۴۶۸۴. E-mail: f.khademi@arums.ac.ir و k_farzad@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: کارباپنم‌ها آنتی بیوتیک‌های اصلی برای درمان عفونت‌های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو (MDR) می‌باشند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع ژن کدکننده پروتئین پورین غشای خارجی (OprD) در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم‌ها و نیز بررسی نقش عناصر توالی الحاقی (IS) در غیرفعال کردن پورین OprD و پیدایش مقاومت به کارباپنم‌ها بود.

روش کار: در این مطالعه، از ۱۰۳ ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا (۵۸٪ ۴۲ و ۲۳٪ سویه که به ترتیب در برابر ایمپینم، مروپینم و دوربینم مقاوم بودند) استفاده گردید. ایزوله‌ها از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر اردبیل جدا شده بودند. حضور ژن oprD و عناصر IS با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و توالی یابی ژنی مورد بررسی قرار گرفت. سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا PAO1 به عنوان سویه کنترل مثبت ژن oprD مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: فراوانی ژن oprD در میان سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم‌ها جدا شده از بیمارستان‌های شهر اردبیل ۹۶/۵ درصد بود. همچنین، در هیچکدام از سویه‌های مورد بررسی عناصر IS مشاهده نشد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، حضور عناصر IS در غیرفعال کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا به کارباپنم‌ها در اردبیل دخیل نیست. لذا، بررسی نقش دیگر موتاسیون‌ها در کاهش بیان ژن oprD و افزایش مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به کارباپنم‌ها توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، توالی الحاقی، OprD

دریافت: ۱۴۰۱/۲/۲۷ پذیرش: ۱۴۰۱/۲/۲۷

استفاده می‌کنند، یافت می‌شود و با طیف گستردگی از عفونت‌های حاد و مزمن از جمله عفونت‌های ریوی، پوست و بافت نرم، دستگاه ادراری، چشم و گوش، باکتریمی و اندوکاردیت مرتبط می‌باشد [۱-۴]. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی مثل مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها^۲ (CDC) و سازمان

مقدمه

سودوموناس آئروژینوزا^۱ یک باسیل گرم منفی، هوایی اجباری، غیرتخمیری و اکسیداز، کاتالاز و اوره‌آز مثبت است. این پاتوژن فرصت‌طلب اغلب در محیط بیمارستان، به ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه و بیمارانی که از وسایل پزشکی مانند ونتیلاتور و کاتر

² Centers for Disease Control and Prevention

^۱ *Pseudomonas aeruginosa*

هیدرولیز کننده کاربپینم‌ها (عمدتاً متالو- β -لاکتامازها^۳)، افزایش تولید AmpC سفالوسپوریناز القایی کروموزومی، کاهش نفوذ پذیری غشای خارجی از طریق تغییر یا کاهش تولید پورین غشای خارجی OprD و در نهایت حضور ایفلاکس پمپ‌های MexAB-OprM (کاهش اثر مروپین)، و MexXY-OprM و MexCD-OprJ (کاهش اثر ایمپینم) می‌باشد [۵,۶,۸]. در میان این مکانیسم‌های مقاومت، نقش پورین غشای خارجی OprD در مقاومت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به کاربپینم‌ها جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر اردبیل مشخص نشده است. به طور کلی، کاربپینم‌ها، بدلیل کوچک و آبدوست بودن، می‌توانند به طور موثری از غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی عبور کنند. آنها با عبور از کanal آبی ارائه شده توسط پروتئین‌های پورین وارد سلول می‌شوند. پورین اصلی برای جذب کاربپینم‌ها در سودوموناس آئروژینوزا پورین OprD می‌باشد [۹]. لکن، جهش‌ها مانند جایگزینی نوکلئوتیدی، حذف و اضافه شدن و حضور عناصر توالی العاقی^۴ (IS) در ژن oprD یا ناحیه پرموتر آن می‌توانند باعث کاهش یا از بین رفتن تولید پورین غشای خارجی OprD شوند و در نتیجه حساسیت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به آنتی بیوتیک‌های کاربپینم را کاهش دهند [۷]. عناصر IS کوچکترین و پرشمارترین عناصر قابل انتقال مستقل^۵ (TE) می‌باشند که نقش مهمی در پیدایش برخی ویژگی‌های مهم در باکتری‌ها از جمله مقاومت در برابر عوامل ضد باکتریایی، بیماریزایی و متابولیسم دارند [۱۰]. بدلیل نامعلوم بودن شیوع ژن oprD و عناصر IS در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا در شهر اردبیل، هدف مطالعه حاضر، تائید حضور ژن oprD در سویه‌های مقاوم به کاربپینم‌ها و همچنین

بهداشت جهانی^۱ (WHO)، مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری‌های گرم منفی و مثبت بطور مداوم در حال افزایش بوده و یک تهدید جدی علیه سلامت عمومی در سراسر جهان محسوب می‌شود [۳]. بطوری که درمان عفونت‌های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا، بدلیل ظهور سویه‌های مقاوم به چند دارو^۲ (MDR)، را به برخی آنتی بیوتیک‌ها از جمله کاربپینم‌ها محدود کرده است [۳]. در حال حاضر، کاربپینم‌ها بعنوان آنتی بیوتیک‌های اصلی برای درمان عفونت‌های ناشی از سویه‌های MDR سودوموناس آئروژینوزا باقی مانده‌اند، اما ایجاد مقاومت در برابر این آنتی بیوتیک‌های موثر ممکن است کارایی آنها را بطور قابل توجهی به خطر اندازد [۵]. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷، پیدایش سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کاربپینم‌ها تهدید جدیدی برای سلامت انسان به شمار می‌رود [۴]. بنابراین، آگاهی از شیوع منطقه‌ای سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کاربپینم‌ها و نیز مکانیسم‌های مقاومت باکتریایی به این آنتی بیوتیک‌ها در کنترل عفونت‌های ناشی از این سویه‌های مقاوم و ممانعت از شکست درمان دارویی موثر خواهد بود. بر اساس یک مطالعه متأنالیز، شیوع سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمپینم و مروپین در ایران به ترتیب ۳۱/۶ درصد و ۴ درصد می‌باشد [۶]. این درحالیست که مطالعه قبلی ما نشان داد شیوع سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمپینم، مروپین و دوربینم در شهر اردبیل به ترتیب ۶۶/۷ درصد، ۴۲/۹ درصد و ۳۳/۳ درصد می‌باشد [۲]. بر اساس مطالعات انجام شده، مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به کاربپینم‌ها چند فاکتوری ووابسته به پلاسمید و کروموزوم بوده و شامل حضور آنزیم‌های

³ Metallo- β -Lactamase

⁴ Insertion Sequence (IS) Elements

⁵ Autonomous Transposable Elements

¹ World Health Organization

² Multidrug-resistant

پلیمراز^۲ (PCR) تعیین شد. با توجه به طویل بودن ژن oprD و به منظور بالابردن بازده PCR از دو جفت پرایمر برای تکثیر کامل ژن استفاده شد. سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا PAO1 به عنوان سویه کنترل مثبت ژن oprD مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۱). پس از الکتروفورز و مشاهده باند مربوط به ژن oprD در ژل آگارز ۱ درصد، محصول PCR برای توالی یابی ژنی^۳ (پیشگام، ایران) ارسال شد. توالی نوکلئوتیدی حاصل از توالی یابی ژنی با توالی نوکلئوتیدی ژن oprD سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا برای تایید حضور ژن مورد نظر مقایسه شد. پس از تایید حضور ژن، توالی نوکلئوتیدی ژن oprD در بانک ژن در مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی^۴ (NCBI) به شماره دسترسی ON009070 ثبت گردید.

حضور عناصر توالی العاقی (IS)

بعد از تایید حضور ژن oprD در روش PCR و مشاهده باند ژن در الکتروفورز، حدوداً ۱۳۳۲ جفت باز برای ژن oprD سویه استاندارد سودوموناس oprD PAO1 در صورتی که اندازه ژن oprD بیش از ۱۳۳۲ جفت باز بود، محصول PCR برای توالی یابی ژنی ارسال و نوع عناصر IS با استفاده از نرم افزار ISfinder (<https://www-is.biotoul.fr/>) آنلاین مشخص شد.

تعیین شیوع عناصر IS در ژن oprD و نقش آن در غیر فعال کردن این پورین و به تبع آن ظهور مقاومت به کارباپنمها در میان سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا بود.

روش کار

ایزوله های بالینی و تست حساسیت ضد میکروبی در این مطالعه از تعدادی سویه سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنمها (به ترتیب ۴۲، ۵۸ و ۲۳ ایزوله مقاوم به ایمپینم، مروپینم و دورپینم) استفاده شد که از بین ۱۰۳ ایزوله جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا، امام خمینی، بوعلی، علوی و سبلان شهر اردبیل بدست آمده بودند. سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنمها از نمونه های بالینی ادرار، خون، خلط و زخم جداسازی و با روش های استاندارد میکروب شناسی و نیز مولکولی تعیین هویت شده بودند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها نسبت به کارباپنمها قبل از تزریق دیسک دیفیوژن تعیین گردیده بود (پادتن طب، ایران) [۱].

حضور ژن oprD در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنمها

ثنوم تمامی سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنمها با استفاده از روش جوشاندن^۱ استخراج شد. بعد از تایید وجود DNA استخراج شده، با استفاده از دستگاه اسپکترو فتو متر نانودرایپ، حضور ژن oprD با استفاده از پرایمر های اختصاصی ژن (متایرون، آلمان) (جدول ۱) و روش واکنش زنجیره ای

² Polymerase Chain Reaction


³ DNA Sequencing

⁴ National Center for Biotechnology Information

^۱ Boiling

جدول ۱. توالی پرایمرهای استفاده شده و شرایط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)

منبع	اندازه محصول	شرایط PCR	توالی پرایم	ژن
[۸]	۶۷۱	(۱ مرحله) مرحله دناتوراسیون اولیه DNA ۹۵ درجه به مدت ۵ دقیقه مرحله دناتوراسیون ثانویه DNA ۹۴ درجه به مدت ۱ دقیقه مرحله اتصال پرایمر به DNA ۵۷ درجه به مدت ۱ دقیقه مرحله سنتز DNA ۷۲ درجه به مدت ۱ دقیقه	F: 5-ATGAAAGTGATGAAGTGGAGC- R: 5-AGGGAGGCCTGAGGTT-3	oprD (a)
	۶۷۴	(۱ مرحله) مرحله دناتوراسیون اولیه DNA ۹۵ درجه به مدت ۵ دقیقه مرحله دناتوراسیون ثانویه DNA ۹۴ درجه به مدت ۱ دقیقه مرحله اتصال پرایمر به DNA ۵۷ درجه به مدت ۱ دقیقه مرحله سنتز DNA ۷۲ درجه به مدت ۱ دقیقه	F: 5-AACCTCAGCGCCCTCC-3 R: 5-ATACTGACCTCTCCTGTTG-3	oprD (b)



شکل ۱. الکتروفوروز محصولات PCR ژن oprD سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم‌ها. چاهک‌های ۱ تا ۵: ژن oprD سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‌های بالینی (۶۷۱ bp و ۶۷۴ bp)، چاهک ۶: ژن oprD سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا PAO1 و چاهک ۷: مارکر ۱۰۰ bp.

بحث

شیوع گسترده سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم‌ها در مراکز بهداشتی و درمانی، زنگ خطر جهانی را به صدا در آورده است، که کنترل آن مستلزم نظارت مداوم بر روند مقاومت و تحقیقات بیشتر روی مکانیسم‌های ایجاد مقاومت در باکتری‌ها می‌باشد. با توجه به بالابودن فراوانی مقاومت به کارباپنم‌ها در سویه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در شهر اردبیل، در این مطالعه، یکی از مهمترین مکانیسم‌های دخیل در مقاومت باکتری به کارباپنم‌ها، در ارتباط با پورین OprD مورد ارزیابی قرار گرفت [۲].

یافته‌ها

در مطالعه توصیفی حاضر، فراوانی ژن oprD بر اساس روش PCR ارزیابی (شکل ۱) و بدین ترتیب گزارش شد: در میان ۵۸ سویه سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمپینم، فراوانی این ژن ۹۶/۵ درصد (۵۶ سویه) بود. سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمپینم و دارای ژن oprD از ۳۰ نمونه ادرار، ۱۵ نمونه خلط، ۷ نمونه زخم و ۴ نمونه خون جداسازی شده بودند. فراوانی ژن oprD در میان ۴۲ ایزوله مقاوم به مروپنام، ۹۶/۵ درصد (۴۰ سویه) بود. ۴ سویه سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به مروپنام و حاوی ژن oprD از ۱۸ نمونه ادرار، ۱۳ نمونه خلط، ۵ نمونه زخم و ۴ نمونه خون جداسازی شده بودند. در نهایت، فراوانی ژن oprD در میان ۲۳ ایزوله مقاوم به دورپینم، ۹۶/۵ درصد (۲۱ سویه) بود. ۲۱ سویه سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به دورپینم حاوی ژن oprD از ۹ نمونه ادرار، ۷ نمونه خلط، ۳ نمونه زخم و ۲ نمونه خون جداسازی شده بودند. ارتباط معنی‌داری بین حضور ژن oprD و نوع نمونه مشاهده نشد.

با توجه به عدم تغییر در اندازه ژن oprD، مطالعه حاضر نشان داد که شیوع عناصر oprD در ژن IS oprD سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم‌ها جداشده از بیمارستان‌های شهر اردبیل صفر درصد می‌باشد.

کردن. نتایج توالی یابی DNA و مقایسه آنها با ژن oprD در سودوموناس آئروژینوزا PAO1 نشان از حضور عناصر IS_{Ppu21} و IS_{Ppu22} داشت [۱۳]. شریعتی و همکاران، و میرصالحیان و همکاران هم حضور عناصر IS_{Ppu21} در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنیم‌ها را گزارش کردند [۱۵, ۱۶]. تعیین توالی ژن oprD و تجزیه و تحلیل آن در مطالعه کلانتر-نیستانکی و همکاران نشان داد که توالی IS_{Ppu22} بطول ۱۲۳۲ جفت باز، در موقعیت ۸ در ناحیه کدکننده ژن oprD اضافه شده است که با ایجاد مقاومت سودوموناس آئروژینوزا به کارباپنیم‌ها مرتبط می‌باشد [۱۷]. در مطالعه رویز-مارتینز^۳ و همکاران، IS_{Pu133}، الایس-ری^۴ و همکاران، IS_{Pu46}، روچو-بزارس^۵ و همکاران، IS_{Pu45}، اوائز^۶ و همکاران، IS_{Pu26}، فولر^۷ و همکاران، IS_{Pu8}، عناصر IS بودند که شناسایی شدند [۱۰]. در مطالعه حاضر، بررسی محصولات PCR ژن oprD در سویه‌های مقاوم به کارباپنیم سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان‌های شهر اردبیل، هیچگونه افزایشی در اندازه ژن oprD در ۱۳۳۲ جفت باز، مشاهده نشد. این نتایج نشان می‌دهد عناصر IS نقشی در پیدایش سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنیم‌ها ندارند. وجود موتاسیون‌های غیرفعال کننده oprD از نوع حذف یا اضافه شدن نوکلئوتیدی در ژن oprD و یا موتاسیون‌های نقطه‌ای ممکن است در ظهور سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنیم‌ها نقش داشته باشند. فاضلی و همکاران در مطالعه انجام شده در شهر اصفهان، وجود موتاسیون‌های نقطه‌ای که منجر به تغییر آمینواسیدی

در مطالعه حاضر، فراوانی ژن oprD در میان سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به کارباپنیم‌ها ۹۶/۵ درصد بود. مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۱۹ توسط نمیما^۱ و همکاران، در کشور نیجریه، نشان داد که ۹۰ درصد از سویه‌های مقاوم به کارباپنیم‌ها دارای ژن oprD بودند [۱۲]. در مطالعه منتشر شده توسط صدرالدین امین و همکاران، در شهر تهران، ۸۹ درصد از سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا دارای ژن oprD بودند [۱۳]. در مطالعه منتشر شده توسط متقی و همکاران در شهر شیراز، از ۶۶ سویه بالینی سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده، ۶۱ درصد حاوی ژن oprD بودند [۱۴]. متفاوت بودن نتایج را می‌توان به وجود موتاسیون‌ها، تغییرات الی و مواد و روش کار نسبت داد.

از دست دادن پورین OprD از غشای خارجی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا هم در سطح رونویسی و هم در سطح ترجمه رخ می‌دهد. جیش‌ها در ژن ساختاری oprD، که یک کدون توقف زودرس ایجاد کرده و موجب خاتمه زود هنگام ترجمه می‌شوند، در سویه‌های بالینی شناسایی شده است [۱۱]. تغییر در ژن کد کننده پورین OprD توسط عناصر IS یکی از مکانیسم‌هایی است که مقاومت به کارباپنیم‌ها را در سودوموناس آئروژینوزا ایجاد می‌کند. اولین بار والتر^۲ و همکاران در سال ۲۰۰۴ از نقش عناصر IS، مانند IS_{Pu1328} و IS_{Pu1635} در غیرفعال کردن بیان ژن oprD و افزایش مقاومت به کارباپنیم‌ها گزارشی ارائه کردند [۱۱]. از آن زمان تاکنون، حضور عناصر IS مختلف کننده ژن oprD در مطالعات مختلفی در ایران و جهان گزارش شده است. برای مثال، صدرالدین امین و همکاران در بررسی ژن oprD در ایزوله‌های مقاوم به کارباپنیم‌ها، اندازه محصولات PCR را بزرگتر از حد انتظار مشاهده

³ Ruiz-Martinez

⁴ Al-Bayssari

⁵ Diene

⁶ Rojo-Bezares

⁷ Evans

⁸ Fowler

¹ Nmema

² Wolter

نتیجہ گیری

در این مطالعه، حضور عناصر IS غیرفعال کننده ژن oprD به عنوان یکی از مکانیسم‌های مقاومت سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا به کاربپن‌ها تائید نشد. با توجه به مطالعات پیشین در خصوص نقش دیگر مکانیسم‌های مقاومت به کاربپن‌ها در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جداسده از بیمارستان‌های شهر اردبیل، بررسی تاثیر موتاسیون‌ها (حذف یا اضافه‌شدن نوکلئوتیدی و یا موتاسیون‌های نقطه‌ای) در غیرفعال‌کردن و کاهش بیان ژن oprD و افزایش مقاومت باکتری به کاربپن‌ها توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از پایان نامه مقطع دکترای حرفه ای و
مصوب معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل، با کد سند ۹۰۷۴۰۰۰۰۹ و کد
IR.ARUMS.MEDICINE.REC.1401.010 اخلاق

در ژن *oprD* در سویه‌های سودوموناس آئرورینوزا مقاوم به کاربپینم‌ها شده بود را گزارش کرداند [۱۸]. لکن، حضور موتاسیون‌های نقطه‌ای در ژن *oprD* در این مطالعه بررسی نشد. از طرف دیگر، بررسی سایر مکانیسم‌های مقاومت به کاربپینم‌ها در مطالعات قبلی ما نشان می‌دهد که سویه‌های سودوموناس آئرورینوزا در شهر اردبیل یا از طریق تولید آنزیم‌های MBL (عملناً *blaVIM* و *blaIMP*) [۱۹] یا از طریق افزایش تولید AmpC سفالوسپوریناز کروموزومی [منتشر نشده] و یا حضور یکی از چهار ایفلاکس پمپ مهـم سـودومـونـاسـی یعنـی MexEF-OprN .MexCD-OprJ .MexAB-OprM و MexXY-OprM به کاربپینم‌ها مقاوم می‌باشدند [منتشر نشده]. از طرف دیگر، مطالعه قبلی ما نشان می‌دهد اینتلگرون‌های کلاس I نقش مهمی در پیدایش سویه‌های MDR سودوموناس آئرورینوزا و نیز سویه‌های مقاوم به کاربپینم‌ها از طریق انتقال کاسته‌های ژنی مقاومت دارند، زیرا شیوع ژن اینتلگرون کلاس I در بین سویه‌های مقاوم به کاربپینم‌ها (دورپینم ۷/۴٪، ایمپینم ۵/۸۵٪ و مروپینم ۴/۶٪) جدا شده در شبد اردبیل، بالا به داده [۲۰].

References

- Bazghandi SA, Safarirad S, Arzanlou M, Peeri-Dogaheh H, Ali-Mohammadi H, Khademi F. Prevalence of multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* strains in Ardabil. J Ardabil Univ Med Sci. Summer 2020; 20(2): 280-6. [Full text in Persian]
 - Bazghandi SA, Arzanlou M, Peeridogaheh H, Vaez H, Sahebkar A, Khademi F. Prevalence of Virulence Genes and Drug Resistance Profiles of *Pseudomonas aeruginosa* Isolated From Clinical Specimens. Jundishapur J Microbiol. 2021 Aug; 14(8): 1-7.
 - Khademi F, Maarofi K, Arzanlou M, Peeri-Dogaheh H, Sahebkar A. Which missense mutations associated with DNA gyrase and topoisomerase IV are involved in *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates resistance to ciprofloxacin in Ardabil?. Gene Rep. 2021 Sep; 24: 101211.
 - Khademi F, Ashrafi SS, Neyestani Z, Vaez H, Sahebkar A. Prevalence of class I, II and III integrons in multidrug-resistant and carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates. Gene Rep. 2021 Dec; 25: 101407.
 - Rodríguez-Martínez JM, Poirel L, Nordmann P. Molecular epidemiology and mechanisms of carbapenem resistance in *Pseudomonas aeruginosa*. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Nov; 53(11): 4783-8.
 - Vaez H, Salehi-Abargouei A, Ghalehnoo ZR, Khademi F. Multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa* in Iran: A systematic review and metaanalysis. J Glob Infect Dis. 2018 Oct; 10(4): 212.

- 7- Fowler RC, Hanson ND. Emergence of carbapenem resistance due to the novel insertion sequence IS Pa 8 in *Pseudomonas aeruginosa*. PLoS One. 2014 Mar; 9(3): e91299.
- 8- Farra A, Islam S, Stralfors A, Sörberg M, Wretlind B. Role of outer membrane protein OprD and penicillin-binding proteins in resistance of *Pseudomonas aeruginosa* to imipenem and meropenem. Int J Antimicrob Agents. 2008 May; 31(5): 427-33.
- 9- Ocampo-Sosa AA, Cabot G, Rodríguez C, Roman E, Tubau F, Macia MD, et al. Alterations of OprD in carbapenem-intermediate and-susceptible strains of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from patients with bacteremia in a Spanish multicenter study. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Apr; 56(4): 1703-13.
- 10- Vandecraen J, Chandler M, Aertsen A, Van Houdt R. The impact of insertion sequences on bacterial genome plasticity and adaptability. Crit Rev Microbiol. 2017 Nov; 43(6): 709-30.
- 11- Wolter DJ, Hanson ND, Lister PD. Insertional inactivation of *oprD* in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* leading to carbapenem resistance. FEMS Microbiol Lett. 2004 Jul; 236(1): 137-43.
- 12- Nmema EE, Osuagwu CS, Anaele EN. *oprD* Genes Detected in *Pseudomonas aeruginosa* Isolates from a Teaching Hospital but Lost in a Carbapenem-Resistant Strain. J Adv Med Med Res. 2019 May; 1-8.
- 13- Sadredinamin M, Hashemi A, Goudarzi H, Tarashi S, Yousefi Nojookambari N, Erfanianmanesh S. Detection of ISPa1328 and ISPpu21, two novel insertion sequences in the OprD porin and *bla IMP-1* gene among metallo-beta-lactamase-producing *Pseudomonas aeruginosa* isolated from burn patients. Arch Trauma Res. 2017 Mar; 6(1): e36239.
- 14- Motaghi B, Najafipour S. Outer membrane protein D gene in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* and its role in antibiotic resistance. J Fasa Univ Med Sci. Winter 2016; 5(4): 501-7. [Full text in Persian]
- 15- Shariati A, Azimi T, Ardebili A, Chirani AS, Bahramian A, Pormohammad A, et al. Insertional inactivation of *oprD* in carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* strains isolated from burn patients in Tehran, Iran. New Microbe and New Infect. 2018 Jan; 21: 75-80.
- 16- Mirsalehian A, Kalantar-Neyestanaki D, Taherikalani M, Jabalameli F, Emaneini M. Determination of carbapenem resistance mechanism in clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from burn patients, in Tehran, Iran. J Epidemiol Glob Health. 2017 Sep; 7(3): 155-9.
- 17- Kalantar-Neyestanaki D, Emaneini M, Jabalameli F, Taherikalani M, Mirsalehian A. ISPpu22, a novel insertion sequence in the *oprD* porin gene of a carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* isolate from a burn patient in Tehran, Iran. Iran J Microbiol. 2015 Oct; 7(5): 247-250.
- 18- Fazeli H, Solgi H, Havaei SA, Shokri D, Norouzi Barogh M, Zamani FZ. Carbapenem and fluoroquinolone resistance in multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa* isolates from Al-Zahra hospital, Isfahan, Iran. J Med Microbiol Infec Dis. 2014 Oct; 2(4): 147-52.
- 19- Safarirad S, Arzanlou M, Mohammadshahi J, Vaez H, Sahebkar A, Khademi F. Prevalence and characteristics of metallo-beta-lactamase-positive and high-risk clone ST235 *Pseudomonas aeruginosa* at Ardabil hospitals. Jundishapur J Microbiol. 2021 Mar; 14(3): e115819.