


الله الرحمن الرحيم



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دانشکده دندانپزشکی
پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای جراحی دندانپزشکی

عنوان:
بررسی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها در گروه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۹ تا
۱۴۰۰ شهر اردبیل

استاد راهنما:
دکتر سولماز جلایر

استاد مشاور:
دکتر حامد زندیان

نگارش:
سینا وثوقی

دیم

تقدیم به پدرم که زندگی را از دستاش،

مادرم که محبت را از نگاهش آموختم

و خانواده ام به پاس ایثار و فداکاری هایشان

تقدیر و سپاسگزاری

هر چند زندگی فقط شایسته ذات بی‌همتای خالق هستی آفرین است و لیکن به مصادیق حدیث شریفه (هر کس حرفی به من بیاموزد مرا بنده خود کرده است) استاد هم، چنان‌شان و مقام والایی دارد که دریای علم و معرفت و پرچم دار توحید هم خود را بنده کسی می‌داند که حتی یک حرف به او بیاموزد، لذا بر خود لازم می‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد ارجمند خانم دکتر سولماز جلایر از صمیم قلب تقدیر و تشکر نمایم.

همچنین از استاد با کمالت و شایسته؛ جناب آقای دکتر حامد زندیان که در کمال سعادت، با حسن خلق و فروتنی، از پیچ‌گلی در این عرصه بر من دریغ نمودند و زحمت مشاوره این پایان‌نامه را بر عهده گرفتند.

همچنین این جانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند اساتید گران‌قدر دانشکده دندانپزشکی اردبیل تقدیر و تشکر نمایم.

چکیده

بررسی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها در گروه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ شهر اردبیل

مقدمه: فقدان مادرزادی دندان‌ها یکی از شایع‌ترین آنومالی‌های تکاملی دندان‌ها است، بنابراین مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها در شهر اردبیل در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ در بازه‌ی سنی ۱۲ تا ۲۵ ساله، انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، ۴۱۰ رادیوگرافی پانورامیک از بیماران ۱۲ تا ۲۵ ساله (۲۲۰ دختر، ۱۹۰ پسر) از نظر فقدان مادرزادی دندان در فک بالا و پایین، ناحیه‌ی (چپ و راست) و کمبود دندان (یک‌طرفه و دو طرفه) بررسی شد. داده‌های به دست آمده با آزمون Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ($\alpha = 0/05$).

نتایج: نتایج بررسی نشان داد که شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها در شهر اردبیل ۸/۵ درصد می‌باشد که بیشتر در فک پایین (۷۷/۱ درصد) مشاهده گردید، اما بر اساس ناحیه‌ی (چپ و راست) و کمبود دندان (یک‌طرفه و دو طرفه) تفاوت معناداری مشاهده نگردید ($P > 0/05$). همچنین نتایج نشان داد که شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس جنسیت و سن تفاوت معناداری نداشت ($P > 0/05$).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع فقدان مادرزادی در اردبیل نسبتاً بالا است؛ بنابراین از آنجا که فقدان دندان باعث مشکلات جدی در زیبایی و تکلم می‌شود، معاینه مکرر و دقیق دندان‌های کودکان جهت تشخیص زودهنگام ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی: هایپودونشیا، دندان‌های دائمی، شیوع.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
	فصل اول: معرفی پژوهش
۱	۱-۱. مقدمه؛ بیان مساله و ضرورت اجرای پژوهش
۲	۲-۱. اهداف پژوهش
۲	۳-۱. هدف کلی
۲	۴-۱. اهداف اختصاصی
۲	۵-۱. اهداف کاربردی
۲	۶-۱. سؤالات پژوهش
۲	۷-۱. تعریف واژه‌ها
	فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۵	۱-۲. مقدمه
۵	۲-۲. مبانی نظری پژوهش
۵	۱-۲-۲. تعریف فقدان مادرزادی دندانی
۵	۲-۲-۲. انواع فقدان دندانی
۵	۱-۲-۲-۲. آنودنشيا
۶	۳-۲-۲. هایپودنشيا
۶	۴-۲-۲. شایع‌ترین دندان‌هایی که به طور مادرزادی وجود ندارد
۷	۵-۲-۲. علل فقدان مادرزادی دندان
۷	۱-۵-۲-۲. توارث
۱۲	۲-۵-۲-۲. عوامل محیطی
۱۲	۳-۵-۲-۲. تغییرات تکاملی
۱۲	۶-۲-۲. تشخیص
۱۳	۳-۲. مروری بر پیشینه‌ی تحقیق
۱۳	۱-۳-۲. پیشینه‌ی پژوهش در ایران
۱۴	۲-۳-۲. پیشینه‌ی پژوهش در خارج
۱۵	۳-۳-۲. جمع‌بندی پیشینه‌های پژوهش
	فصل سوم: مواد و روش‌ها
۲۵	۱-۳. نوع مطالعه و روش پژوهش
۲۵	۲-۳. جامعه‌ی آماری پژوهش
۲۵	۳-۳. معیارهای ورود و خروج به مطالعه
۲۵	۴-۳. حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
۲۵	۵-۳. ابزار و روش گردآوری داده‌ها
۲۶	۶-۳. روایی و پایایی ابزار
۲۶	۷-۳. زمان و مکان انجام پژوهش
۲۶	۸-۳. متغیرهای پژوهش
۲۷	۹-۳. روش‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها
۲۷	۱۰-۳. ملاحظات اخلاقی
	فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۲۹	۱-۴. آمار توصیفی
۲۹	۱-۱-۴. جنسیت افراد مورد بررسی

۲۹ سن افراد مورد بررسی	۲-۱-۴
۳۰ شیوع فقدان مادرزادی دندان	۳-۱-۴
۳۱ شیوع فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس فک	۴-۱-۴
۳۲ شیوع فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس ناحیه	۵-۱-۴
۳۳ شیوع فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس کمبود دندان	۶-۱-۴
۳۴ آمار تحلیلی	۲-۴
۳۴ مقایسه‌ی شیوع فک فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس سن	۱-۲-۴
۳۵ مقایسه‌ی شیوع ناحیه‌ی فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس سن	۲-۲-۴
۳۶ مقایسه‌ی شیوع کمبود مادرزادی دندان ها بر اساس سن	۳-۲-۴
۳۶ مقایسه‌ی شیوع فک فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس جنسیت	۴-۲-۴
۳۷ مقایسه‌ی شیوع ناحیه‌ی فقدان مادرزادی دندان ها بر اساس جنسیت	۵-۲-۴
۳۸ مقایسه‌ی شیوع کمبود مادرزادی دندان ها بر اساس جنسیت	۶-۲-۴
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش		
۴۱ بحث	۱-۵
۴۳ نتیجه‌گیری	۲-۵
۴۳ محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش	۳-۵
۴۳ پیشنهادهای	۱-۳-۵
۴۳ محدودیت‌ها	۲-۳-۵
۴۱ منابع	
۴۷ پیوست‌ها	

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۲۹	جدول ۱-۴ درصد فراوانی جنسیت افراد مورد بررسی
۲۹	جدول ۲-۴ درصد فراوانی سن افراد مورد بررسی
۳۰	جدول ۳-۴ درصد فراوانی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها
۳۱	جدول ۴-۴ درصد فراوانی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس فک
۳۲	جدول ۵-۴ درصد فراوانی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس ناحیه
۳۳	جدول ۶-۴ درصد فراوانی شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس کمبود دندان
۳۴	جدول ۷-۴ مقایسه‌ی شیوع فک فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس سن
۳۵	جدول ۸-۴ مقایسه‌ی شیوع ناحیه‌ی فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس سن
۳۶	جدول ۹-۴ مقایسه‌ی شیوع کمبود دندان یکطرفه و دو طرفه بر اساس سن
۳۶	جدول ۱۰-۴ مقایسه‌ی شیوع فک فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس جنسیت
۳۷	جدول ۱۱-۴ مقایسه‌ی شیوع ناحیه‌ی فقدان دندان‌های مادرزادی بر اساس جنسیت

جدول ۴-۱۲. مقایسه‌ی شیوع کمبود دندان‌های مادرزادی بر اساس جنسیت..... ۳۸

فهرست نمودارها

صفحه	عنوان
۲۹.....	نمودار ۴-۱. درصد جنسیت افراد مورد بررسی.....
۳۰.....	نمودار ۴-۲. درصد سن افراد مورد بررسی.....
۳۱.....	نمودار ۴-۳. درصد شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها.....
۳۲.....	نمودار ۴-۴. درصد شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس فک.....
۳۳.....	نمودار ۴-۵. درصد شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس ناحیه.....
۳۴.....	نمودار ۴-۶. درصد شیوع فقدان مادرزادی دندان‌ها بر اساس کمبود دندان.....