



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکترای عمومی در رشتهٔ پزشکی

عنوان:

ارزیابی فرایند سوگ و افکار خودکشی در خانواده افراد دارای خودکشی منجر به فوت در

شهرستان اردبیل در سال ۱۴۰۰

نگارش:

امیر حاجی سلیمانی

اساتید راهنمای:

دکتر فرشید شهریاری

دکتر مهریار ندر محمدی

بهمن ۱۴۰۱

شماره پایان نامه: ۱۰۰۸

تقدیم به

پدر و مادرم

این دو تکیه گاه بزرگ زندگیم ، که هر چه دارم مديون
همراهی و زحمات بی دریغ آنهاست.

اساتید ارجمند

که همواره با چراغ علمشان روشنی بخش تاریکی جهل
بوده اند

سپاسگزاری

سپاس خدای را که سخنوران ، درستودن او بمانند و شمارندگان ، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان ، حق او را گزاردن نتوانند . اکنون که باید آغازی بر یک پایان بنگارم ، بر خود لازم می دانم که از استادان عزیزم به خاطر راهنماییهای ارزشمند نهایت تشکر و قدردانی را نمایم .

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱.....	چکیده
۳.....	فصل اول
۴.....	۱- اهمیت موضوع و انگیزه‌ی تحقیق
۷.....	۲-۱ اهداف و فرضیات طرح.....
۷.....	۲-۱-۱ هدف کلی طرح.....
۷.....	۲-۱-۲ اهداف اختصاصی طرح.....
۷.....	۲-۱-۳ اهداف کاربردی.....
۸.....	۲-۱-۴ فرضیات یا سؤالات تحقیق
۸.....	۳-۱ تعریف واژه‌های اختصاصی
۱۲.....	فصل دوم
۱۳.....	۲-۱-۱ مقدمه
۱۳.....	۲-۱-۲ واکنش‌ها و ویژگی‌های سوگ
۱۵.....	۲-۱-۲-۱ سوگ بعد از خودکشی در بازماندگان
۱۸.....	۲-۱-۲-۲ نیاز به درک، احساس گناه و حس مسئولیت
۱۹.....	۲-۱-۲-۳ نیاز به درک، احساس گناه و حس مسئولیت

۲۰	۱-۲ طرد شدن، حس رها شدن و خشم
۲۱	۱-۲ انگ (استیگما) مربوط به خودکشی
۲۲	۱-۲ ترومای روانی در بازماندگان.....
۲۲	۱-۲ خطر خودکشی در بازماندگان
۲۳	۱-۲ سوگواری عارضه دار(CG) در بازماندگان خودکشی
۲۴	۱-۲ پیامد های رفتاری در بازماندگان
۲۵	۱-۲ گروه های حمایت کننده.....
۲۶	۱-۲ درمان مناسب در سوگ خودکشی همراه با افسردگی یا اختلال استرس پس از سانحه
۲۷	۱-۲ سوگ خودکشی و سوگواری عارضه دار.....
۲۹	۱-۲ مطالعات پیشین داخلی.....
۲۹	۱-۲-۲ مطالعات پیشین خارجی
۳۰	۱-۳-۲ نتیجه گیری.....
۳۲	فصل سوم:
۳۲	۱-۳ نوع مطالعه
۳۳	۲-۳ جامعه آماری و روش نمونه گیری
۳۴	۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات
۳۵	۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
۳۶	۳-۳ ملاحظات اخلاقی.....
۳۶	۳-۳ متغیر های مطالعه

فصل چهارم :

۳۹ ۱-۴ مقدمه

۴۱ ۲-۴ ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان

۴۲ ۴-۳ نتایج حاصل از پرسشنامه های افکار خودکشی بک و تجربه‌ی سوگ

۴۹ ۴-۳-۱ تعیین میزان افکار خودکشی در پدران افراد خودکشی کرده

۵۰ ۴-۳-۲ تعیین میزان افکار خودکشی در مادران افراد خودکشی کرده

۵۱ ۴-۳-۳ تعیین میزان افکار خودکشی در خواهران و برادران افراد خودکشی کرده

۵۳ ۴-۳-۴ تعیین میزان احساس گناه در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده

۵۴ ۴-۳-۵ تعیین میزان نگرانی اعضای خانواده افراد خودکشی کرده از قضاوت دیگران در مورد دلیل فوت

۵۵ ۴-۳-۶ تعیین میزان خجالت و شرم‌مندگی در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده

۵۶ ۴-۳-۷ تعیین میزان احساس بدنامی در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده

۵۷ ۴-۳-۸ تعیین میزان احساس ترک شدن در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده

۵۷ ۴-۳-۹ تعیین میزان سوگ عارضه دار در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده

۵۹ فصل پنجم:

۶۰ ۱-۵ بحث

۶۴ ۲-۵ محدودیت مطالعه

۶۵ ۳-۵ نتیجه گیری

۶۶ ۴-۵ پیشنهادات

۶۶ ۴-۵-۱ پیشنهادات برخواسته از مطالعه

۶۶	۴-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی
۶۷	منابع

فهرست جداول، اشکال و نمودارها

جدول ۱-۳: متغیرهای به کار رفته در این پژوهش ۳۶
جدول ۱-۴ اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان ۴۰
جدول ۲-۴ نمره‌ی کلی و نمره‌ی ابعاد پرسشنامه‌ی تجربه‌ی سوگ در شرکت کنندگان ۴۳
جدول ۳-۴ میانگین نمرات پرسشنامه‌ی تجربه‌ی سوگ در شرکت کنندگان به تفکیک نسبت و ابعاد ۴۴
جدول ۴-۴: تفسیر پرسشنامه‌های افکار خودکشی بک و تجربه‌ی سوگ در شرکت کنندگان ۴۵
جدول ۵-۴: تفسیر پرسشنامه‌ی تجربه‌ی سوگ در شرکت کنندگان به تفکیک نسبت با فرد متوفی ۴۶
نمودار ۱-۴: فراوانی تجربه سوگ شرکت کنندگان به تفکیک نسبت با فرد متوفی ۴۷
جدول ۶-۴ تفسیر پرسشنامه‌ی افکار خودکشی بک در شرکت کنندگان به تفکیک نسبت با فرد متوفی ۴۸
نمودار ۲-۴ فراوانی شرکت کنندگان در پرسشنامه افکار خودکشی بک به تفکیک نسبت با فرد متوفی ۴۹
نمودار ۳-۴: تعیین میزان افکار خودکشی در بین پدران افراد خودکشی کرده ۵۰
نمودار ۴-۴: تعیین میزان افکار خودکشی در بین مادران افراد خودکشی کرده ۵۱
نمودار ۵-۴: تعیین میزان افکار خودکشی در بین برادران افراد خودکشی کرده ۵۲
نمودار ۶-۴: تعیین میزان افکار خودکشی در بین خواهران افراد خودکشی کرده ۵۳
جدول ۷-۴ میزان بعد احساس گناه در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده ۵۴
جدول ۸-۴ میزان بعد نگرانی اعضای خانواده افراد خودکشی کرده از قضاوت دیگران در مورد دلیل فوت .. ۵۵
جدول ۹-۴ تعیین میزان خجالت و شرم‌نگاری در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده ۵۶
جدول ۱۰-۴ میزان بعد احساس بدنامی در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده ۵۷
جدول ۱۱-۴ میزان احساس ترک شدن در اعضای خانواده افراد خودکشی کرده ۵۸

فهرست اختصارات و کلمات کلیدی:

AAS: American Association of Suicidology

AFSP: American Foundation for Suicide Prevention

CBT: Cognitive Behavioral Therapy

GEQ: Grief Experience Questionnaire

CG: Complicated Grief

CGT: Complicated Grief Therapy

MDD: Major Depressive Disorder

PTSD: Posttraumatic Stress Disorder

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

WHO: World Health Organization

ارزیابی فرایند سوگ و افکار خودکشی در خانواده افراد دارای خودکشی منجر به فوت در

شهرستان اردبیل در سال ۱۴۰۰

چکیده

زمینه : با توجه به اینکه بازماندگان افراد دارای خودکشی منجر به فوت از میزان آسیب روانی بالایی برخوردار اند، توجه زیادی به مطالعه‌ی فاکتورهای مستعد کننده در خودکشی وجود دارد.

هدف : هدف از انجام این مطالعه ارزیابی فرایند سوگ و افکار خودکشی در خانواده افراد دارای خودکشی منجر به فوت در شهرستان اردبیل در سال ۱۴۰۰ بود.

مواد و روش کار: جامعه‌ی آماری این مطالعه، کلیه بستگان درجه‌ی یک افراد با خودکشی منجر به فوت بودند. پرسشنامه‌ها تا حداقل ۶ ماه و حداقل بعد از یک سال از وقوع خودکشی تکمیل گردید. تمام شرکت کنندگان با استفاده از آزمون افکار خودکشی بک و پرسشنامه تجربه سوگ مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: تعداد ۲۱۱ نفر از بستگان درجه‌ی های خودکشی اول منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ وارد مطالعه شدند که از این تعداد ۱۰۴ نفر مرد و ۱۰۷ نفر زن بودند. متوسط سن شرکت کنندگان در مطالعه $42/28 \pm 11/76$ محاسبه

گردید و میانگین نمره کل پرسشنامه تجربه سوگ $81/46 \pm 12/62$ بدست آمد. از نظر زیرمقیاس‌های پرسشنامه، ابعاد زیر بیشترین امتیاز را در بین بستگان درجه‌ی یک خودکشی کنندگان منجر به فوت کسب نمودند: بعد احساس گناه، بعد تلاش برای توجیه و کنارآمدن. از نظر نمره کلی پرسشنامه در ۷۰ نفر تجربه سوگ متوسط، در ۳۱ نفر تجربه سوگ کم و در ۱۰ نفر تجربه سوگ زیاد گزارش گردید. براساس پرسشنامه افکار خودکشی بک،

۱۵۴ نفر از شرکت کنندگان افکار خودکشی نداشتند، ۳۰ نفر احتمال خودکشی با ریسک پایین، ۲۲ نفر احتمال خودکشی با ریسک بالا، ۵ نفر قصد اقدام به خودکشی داشتند.

نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، اکثریت افراد تجربه سوگ متوسط داشتند و بیشترین نمره به بعد احساس گناه اختصاص داشت؛ هم چنین اکثر شرکت کنندگان افکار خودکشی نداشتند.

کلمات کلیدی : سوگ - یک درجه بستگان خودکشی -