



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکترای حرفه ای رشته پزشکی

بررسی فراوانی هماتوم بعد از عمل جراحی در بیماران هرنی اینگویینال

مصرف کننده آسپرین در بیمارستان های امام خمینی و فاطمی اردبیل

طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰

نگارش:

الهه ایدری

استاد راهنما:

دکتر محمد وکیلی

اساتید مشاور:

دکتر مهزاد یوسفیان

دکتر کاظم نجاتی

مهر ماه ۱۴۰۲

شماره پایان نامه: ۰۱۰۷۸

بسمه تعالی

گواهی اصالت پایان نامه

اینجانب الهه ایدری دانشجوی مقطع دکتری رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تأیید مینمایم که:

- این پایان نامه بر اساس نتایج بررسیها/ تحقیقات انجام یافته توسط اینجانب تحت راهنمای..... بوده و بوسیله خودم انشا گردیده است و در صورت استفاده از نتایج پژوهش ها و یا آثار دیگران بلافاصله به مرجع مورد استفاده استناد شده است و در قسمت منابع و مأخذ مشخصات مرجع به طور کامل ذکر گردیده است.

- مسئولیت صحت مطالب مندرج در این پایان نامه به طور کامل با اینجانب است.

- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

- کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه و هر گونه محصول مستخرج از آن اعم از مقالات، چاپ کتاب و ثبت اختراع به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تعلق دارد و هرگونه استفاده از اطلاعات و یا نتایج، واگذاری اطلاعات به افراد دیگر، چاپ، تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ممنوع است.

- کلیه مقالات مستخرج از این پایان نامه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (Ardabil University of Medical sciences) به عنوان وابستگی نویسنده اول یا مسئول و با اطلاع و اجازه تمامی اساتید راهنما و مشاور به چاپ رسیده یا خواهد رسید.

- چنانچه در هر مقطع زمانی، خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت برخورد قانونی، هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو

امضا و تاریخ

- بدینوسیله اصالت و صحت نتایج این پایان نامه مورد تأیید اینجانب، راهنما می باشد.

نام و نام خانوادگی استادراهنما

امضا و تاریخ

تقديم به

مادر و پدرم
که به من جان بخشیدند

سپاسگزارى

سپاس بى کران پروردگار یکتا را که هستى مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. از استاد گرانقدر جناب آقای وکیللى به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داد، کمال تشکر را دارم.

همچنین از اساتید بزرگوام جناب آقای دکتر نجاتى و سرکار خانم دکتر یوسفیان که با زحمات بى دریغ و الطاف خود مشاوره این پایان نامه را عهده دار بودند، نهایت تشکر را دارم.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده
	فصل اول: مقدمه
۴	۱-۱- اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق
۷	۱-۲- اهداف و فرضیات طرح
۷	۱-۲-۱- اهداف اختصاصی طرح
۷	۱-۲-۲- اهداف اختصاصی طرح
۸	۲-۱-۳- هدف کاربردی
۸	۱-۲-۴- فرضیات
۸	۱-۳- تعریف واژه های اختصاصی
	فصل دوم : بررسی متون
۱۱	۲-۱- مبانی نظری
۱۱	۲-۱-۱- مقدمه ای بر فتق های دیواره شکم
۱۱	۲-۱-۲- انواع فتق های دیواره شکم
۱۲	۲-۱-۳- علل بروز فتق
۱۲	۲-۱-۴- عوارض فتق
۱۳	۲-۲- مقدمه ای بر فتق اینگوینال
۱۵	۲-۳- مطالعات مشابه

فصل سوم: مواد و روش کار

۲۰	۳-۱- گروه‌های مورد مطالعه
۲۰	۳-۱-۱- جامعه هدف
۲۰	۳-۱-۲- جامعه مورد مطالعه
۲۰	۳-۱-۳- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
۲۰	۳-۲- روش انجام مطالعه
۲۱	۳-۳- روش تحلیل داده‌ها
۲۱	۳-۴- روش تحلیل داده‌ها
۲۲	۳-۵- جدول متغیرها

فصل چهارم: نتایج

۲۴	۴-۱- نتایج توصیفی مطالعه
۲۴	۴-۱-۱- مشخصات دموگرافیک و پایه بیماران مورد مطالعه
۲۷	۴-۱-۲- فراوانی هماتوم در بیماران مورد مطالعه

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۳۱	۵-۱- بحث
۳۴	۵-۲- محدودیت‌های مطالعه
۳۵	۵-۳- نتیجه‌گیری
۳۶	۵-۴- پیشنهادات
۳۷	۵-۵- ترجمان دانش
۳۹	منابع
۴۷	Abstract

فهرست جداول

صفحه

عنوان

جدول ۴-۱ مشخصات دموگرافیک بیماران مورد مطالعه..... ۳۰

فهرست نمودارها

صفحه	عنوان
۲۹.....	نمودار ۴-۱ توزیع سنی (سال) بیماران مورد مطالعه.....
۳۱.....	نمودار ۴-۲ توزیع مدت زمان مصرف آسپیرین (سال) در بیماران مورد مطالعه.....
۳۲.....	نمودار ۴-۲ فراوانی بیماری زمینه‌ای در بیماران مورد مطالعه.....

اختصارات

- 1) COX Cyclooxygenase
- 2) NSAID Non steroidal Anti-inflammatory drugs

بررسی فراوانی هماتوم بعد از عمل جراحی در بیماران هرنی اینگوینال مصرف کننده آسپرین در بیمارستان های امام خمینی و فاطمی اردبیل طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰

چکیده

زمینه: فتق اینگوینال شیوع بالایی داشته و میتواند با عوارض خطرناکی نظیر گیرافتادگی و انسداد روده و حتی مرگ همراهی داشته باشد، لذا همه فتقها باید مورد عمل جراحی قرار گیرند و آن چه در بررسی ترمیم این فتقها اهمیت دارد، کاهش میزان عود و بهبود هر چه سریع تر بیماران میباشد. عوارض داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی نظیر آسپرین در جراحی های ترمیم هرنی اینگوینال محل بحث میباشد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی هماتوم بعد از عمل جراحی در بیماران هرنی اینگوینال مصرف کننده آسپرین در بیمارستان های امام خمینی و فاطمی اردبیل طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اجرا شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه به صورت مقطعی ۵۵ بیمار که تحت جراحی هرنی اینگوینال در مرکز درمانی فاطمی و امام خمینی اردبیل در بازه ی زمانی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ با سابقه مصرف آسپرین بررسی شدند. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و رزن ۲۷ انجام شد.

نتایج: فراوانی مصرف آسپرین در بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال باز ۲/۳ درصد بوده است. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه نیز ۶۷/۸ سال بوده و همه بیماران مرد بودند. در هیچ یک از بیماران هماتوم بعد از جراحی رخ نداده است.

نتیجه گیری: مصرف آسپیرین در محدوده دوز درمانی با بروز هماتوم بعد از جراحی هرنیورافی باز اینگوئینال همراهی نداشته است و بیماران تحت درمان با آسپیرین بدون نیاز به قطع دارو میتوانند تحت جراحی ترمیم هرنی قرار گیرند.

کلمات کلیدی: آسپیرین، هرنی اینگوئینال، جراحی، عوارض، هماتوم