



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته پزشکی

عنوان: بررسی شدت علایم و نشانه های اختلال دوقطبی ۱ در بیماران دوقطبی دارای اختلال

شخصیت خوشه B و C

نگارش:

علی کریمی

اساتید راهنما:

دکتر آنیتا آذرکلاه

دکتر بهنام مولایی

استاد مشاور:

دکتر مهريار ندرمحمدی

آبان ماه ۱۴۰۲

شماره پایان نامه: ۰۱۰۴۹

تقدیم به

پدر و مادر خودم و همسر...

این تکیه گاههای بزرگ زندگیم ، که هر چه دارم مدیون همراهی و
زحمات بی دریغ آنهاست.

اساتید ارجمندم ...

که همواره با چراغ علمشان روشنی بخش تاریکی جهل بوده اند

همسر و پسر نازنینم...

که عشق را در وجودم معنا کردند

سپاسگزاری

سپاس خدای را که سخنوران ، درستودن او بمانند و شمارندگان ،
شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان ، حق او را گزاردن نتوانند .
اکنون که باید آغازی بر یک پایان بنگارم ، بر خود لازم می دانم که از
استادان عزیزم به خاطر راهنماییهای ارزشمند نهایت تشکر و قدردانی
را نمایم.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	چکیده
۴	فصل اول
۴	۱-۱- اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق:
۹	۱-۲- اهداف:
۹	۱-۲-۱- هدف کلی مطالعه:
۱۰	۱-۲-۲- اهداف اختصاصی:
۱۰	۱-۲-۳- اهداف کاربردی:
۱۱	۱-۲-۴- سوالات:
۱۱	۱-۳- تعریف واژه ها:
۱۱	۱-۳-۱- اختلال دوقطبی نوع یک:
۱۲	۱-۳-۲- مانیا:
۱۲	۱-۳-۳- اختلال شخصیت:
۱۳	۱-۳-۴- اختلال شخصیت خوشه B:
۱۳	۱-۳-۵- اختلال شخصیت خوشه C:
۱۴	فصل دوم
۱۴	۲-۱- مبانی نظری:
۱۴	۲-۱-۱- اختلال دوقطبی:
۱۵	۲-۱-۱-۱- مقدمه کلی:
۱۶	۲-۱-۱-۲- همه گیر شناسی:
۱۷	۲-۱-۱-۳- تظاهرات بالینی:
۲۶	۲-۱-۱-۴- همبودی:
۳۱	۲-۱-۱-۵- عملکرد عصبی شناختی:
۳۲	۲-۱-۱-۶- خودکشی:
۳۴	۲-۱-۱-۷- خشونت:
۳۶	۲-۱-۱-۸- درمان:
۴۴	۲-۱-۲- اختلالات شخصیتی:

۴۵ ۲-۱-۲-۱-۲- مقدمه:
۴۶ ۲-۱-۲-۲- همه گیر شناسی:
۴۸ ۲-۱-۲-۳- تظاهرات بالینی:
۵۰ ۲-۱-۲-۴- پیامدهای اختلالهای شخصیتی:
۵۰ ۲-۱-۲-۵- تشخیص:
۵۹ ۲-۱-۲-۶- درمان:
۶۷ ۲-۲- بررسی متون:
۶۷ ۲-۲-۱- مطالعات خارجی:
۷۴ ۲-۲-۲- مطالعات داخلی:

فصل سوم

۷۸ ۳-۱- نوع مطالعه:
۷۹ ۳-۲- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری:
۷۹ ۳-۳- حجم نمونه:
۸۰ ۳-۴- روش گردآوری اطلاعات:
۸۲ ۳-۵- طرح مطالعه:
۸۳ ۳-۶- معیارهای ورود به مطالعه:
۸۳ ۳-۷- معیارهای خروج از مطالعه:
۸۳ ۳-۸- تست های آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها:
۸۴ ۳-۹- ملاحظات اخلاقی:
۸۵ ۳-۱۰- جدول متغیرها:

فصل چهارم

۸۷ ۴-۱- اطلاعات دموگرافیک بیماران:
۹۸ ۴-۲- شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B:
۱۰۱ ۴-۳- شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه C:
۱۰۵ ۴-۴- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C:
۱۰۶ ۴-۵- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در طبقات سنی مختلف:
۱۰۷ ۴-۶- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در دوجنس زن و مرد:
۱۰۸ ۴-۷- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با وضعیت تاهل متفاوت (مجرد، متأهل، مطلقه):
۱۱۰ ۴-۸- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با وضعیت تحصیلی متفاوت:

- ۴-۹- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C که دارای طول مدت بیماری متفاوتی هستند: ۱۱۲
- ۴-۱۰- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C که دارای سن شروع بیماری متفاوتی هستند: ۱۱۳
- ۴-۱۱- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با و بدون سابقه خودکشی: ۱۱۶
- ۴-۱۲- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C براساس وضعیت اعتیاد: ۱۱۸
- ۴-۱۳- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C براساس وضعیت سوءمصرف الکل: ۱۱۹
- ۴-۱۴- یافته های دیگر: ۱۲۰
- ۴-۱۴-۱- بررسی ارتباط بین سابقه خودکشی و مصرف الکل در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C: ۱۲۰
- ۴-۱۴-۲- بررسی ارتباط بین سابقه مثبت خانوادگی بیماری های روانپزشکی و شروع بیماری دوقطبی در سنین پایین در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت: ۱۲۱
- ۳-۱۴-۴- بررسی ارتباط بین نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی حاصل از تست MCMII: ۱۲۲
- ۴-۱۴-۴- بررسی و مقایسه نمرات اختلالات شخصیتی خوشه B و C در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C: ۱۲۲
- فصل پنجم** ۱۲۴
- ۵-۱- بحث: ۱۲۴
- ۵-۱-۱- شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B (گروه ۱): ۱۲۵
- ۵-۱-۲- شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه C (گروه ۲): ۱۲۷
- ۵-۱-۳- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C: ۱۲۹
- ۵-۱-۴- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در طبقات سنی مختلف: ۱۳۱
- ۵-۱-۵- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در دوجنس زن و مرد: ۱۳۲
- ۵-۱-۶- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با وضعیت تاهل متفاوت (مجرد، متأهل، مطلقه): ۱۳۳
- ۵-۱-۷- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با وضعیت تحصیلی متفاوت: ۱۳۵
- ۵-۱-۸- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C که دارای سن شروع بیماری متفاوتی هستند: ۱۳۷
- ۵-۱-۹- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C در افراد با و بدون سابقه خودکشی: ۱۳۹
- ۵-۱-۱۰- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C براساس وضعیت اعتیاد: ۱۴۲
- ۵-۱-۱۱- تفاوت شدت علائم و نشانه های بیماری دوقطبی I در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C براساس وضعیت سوءمصرف الکل: ۱۴۴

۱۲-۱-۵- بررسی ارتباط بین سابقه خودکشی و مصرف الکل در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت خوشه B و C: ۱۴۶

۱۳-۱-۵- بررسی ارتباط بین سابقه مثبت خانوادگی بیماری های روانپزشکی و شروع بیماری دوقطبی در سنین پایین در بیماران دوقطبی دارای اختلال شخصیت: ۱۴۸

۲-۵- محدودیت های مطالعه: ۱۵۰

۳-۵- نتیجه گیری: ۱۵۱

۴-۵- پیشنهادات: ۱۵۳

منابع ۱۵۶

ضمایم ۱۷۵

فهرست جداول

جدول ۳-۱- متغیرهای مورد بررسی	۸۶
جدول ۴-۱- اطلاعات دموگرافیک بیماران	۸۸
جدول ۴-۲- میانگین، کمینه و بیشینه سن شرکت کنندگان مطالعه	۹۸
جدول ۴-۳- بررسی ارتباط بین میانگین نمرات اختلالات شخصیتی خوشه B با شدت مانیا در تمام بیماران تحت مطالعه	۹۹
جدول ۴-۴- بررسی ارتباط بین میانگین نمرات اختلالات شخصیت خوشه B با شدت مانیا در بیماران "گروه ۱"	۱۰۰
جدول ۴-۵- بررسی ارتباط بین شدت مانیا با تک تک اختلالات شخصیتی خوشه B در تمام بیماران تحت مطالعه	۱۰۰
جدول ۴-۶- بررسی ارتباط بین شدت مانیا با تک تک اختلالات شخصیت خوشه B در بیماران "گروه ۱"	۱۰۱
جدول ۴-۷- بررسی ارتباط بین میانگین نمرات اختلالات خوشه C با شدت مانیا در تمام بیماران تحت مطالعه	۱۰۲
جدول ۴-۸- بررسی ارتباط بین میانگین نمرات اختلالات شخصیت خوشه C با شدت مانیا در بیماران "گروه ۲"	۱۰۳
جدول ۴-۹- بررسی ارتباط تک تک اختلالات شخصیتی خوشه C با شدت مانیا در تمام بیماران تحت مطالعه	۱۰۴
جدول ۴-۱۰- بررسی ارتباط تک تک اختلالات شخصیتی خوشه C با شدت مانیا در بیماران گروه ۲	۱۰۴
جدول ۴-۱۱- مقایسه نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی در دو دسته بیمار اختلال شخصیت خوشه B و C (گروه ۱ و ۲)	۱۰۵
جدول ۴-۱۲- آزمون T در بررسی ارتباط بین نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی در گروه های ۱ و ۲	۱۰۶
جدول ۴-۱۳- بررسی ارتباط بین سن و نمرات میانگین اختلالات خوشه B و C و نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی	۱۰۶
جدول ۴-۱۴- ارتباط بین نمره طیف دوقطبی و سن در گروه ۱	۱۰۷
جدول ۴-۱۵- مقایسه متغیرهای شدت مانیا در جنسیت های مختلف	۱۰۷
جدول ۴-۱۶- آزمون T برای بررسی ارتباط شدت مانیا در جنسیت های مختلف	۱۰۸
جدول ۴-۱۷- آزمون مجذور کای جهت بررسی ارتباط بین جنسیت و گروه های ۱ و ۲	۱۰۸
جدول ۴-۱۸- آزمون ANOVA برای بررسی ارتباط بین نمره مانیای یانگ و وضعیتهای تاهلی مختلف	۱۰۹
جدول ۴-۱۹- مقایسه نمره مانیای یانگ در بیماران با وضعیت های تاهلی مختلف	۱۰۹
جدول ۴-۲۰- آزمون ANOVA برای بررسی ارتباط بین نمره طیف دوقطبی و وضعیت های تاهلی مختلف	۱۰۹
جدول ۴-۲۱- مقایسه نمره طیف دوقطبی در بیماران با وضعیت های تاهلی مختلف	۱۱۰
جدول ۴-۲۲- آزمون مربع کای در بررسی ارتباط بین وضعیتهای تاهلی مختلف و ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C	۱۱۰
جدول ۴-۲۳- بررسی و مقایسه متغیرهای شدت مانیا در وضعیت های تحصیلی مختلف	۱۱۱
جدول ۴-۲۴- آزمون ANOVA برای بررسی ارتباط بین متغیرهای شدت مانیا و وضعیت های مختلف تحصیلی	۱۱۱
جدول ۴-۲۵- آزمون مربع کای در بررسی ارتباط بین وضعیت های تحصیلی مختلف و ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C	۱۱۲

- جدول ۲۶-۴- بررسی ارتباط بین طول مدت بیماری و متغیرهای شدت مانیا و میانگین نمرات اختلالات شخصیت خوشه های B و C ۱۱۳
- جدول ۲۷-۴- بررسی ارتباط بین نمره طیف دوقطبی و طول مدت بیماری در بیماران گروه ۱ ۱۱۳
- جدول ۲۸-۴- ارتباط بین سن شروع بیماری دوقطبی با شدت مانیا و میانگین نمرات اختلالات شخصیت خوشه های B و C ۱۱۴
- جدول ۲۹-۴- ارتباط بین سن شروع بیماری دوقطبی و شدت مانیا و میانگین نمرات خوشه های B و C در بیماران گروه ۱ ۱۱۵
- جدول ۳۰-۴- مقایسه زمان شروع بیماری دوقطبی در بیماران با اختلالات شخصیتی خوشه B و C ۱۱۵
- جدول ۳۱-۴- آزمون T در بررسی ارتباط بین سن شروع بیماری و ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C ۱۱۵
- جدول ۳۲-۴- مقایسه شدت مانیا براساس تست مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی در بیماران دوقطبی با و بدون سابقه خودکشی ۱۱۶
- جدول ۳۳-۴- آزمون T در بررسی ارتباط سابقه خودکشی و شدت مانیا طبق آزمون مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی در کل بیماران ۱۱۷
- جدول ۳۴-۴- مقایسه شدت مانیا براساس آزمون مانیای یانگ و تست MCMi در بیماران گروه ۱ با و بدون سابقه خودکشی ۱۱۷
- جدول ۳۵-۴- آزمون T در بررسی ارتباط سابقه خودکشی و شدت مانیا براساس آزمون مانیای یانگ و تست MCMi در بیماران گروه ۱ ۱۱۷
- جدول ۳۶-۴- آزمون مربع کای در بررسی ارتباط بین وضعیت اعتیاد و ابتلا به انواع اختلالات شخصیتی ۱۱۸
- جدول ۳۷-۴- آزمون ANOVA در بررسی ارتباط بین وضعیت اعتیاد و شدت مانیا ۱۱۸
- جدول ۳۸-۴- آزمون مربع کای در بررسی ارتباط بین مصرف الکل و ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C در بیماران دوقطبی تحت مطالعه ۱۱۹
- جدول ۳۹-۴- بررسی مصرف الکل در بیماران دوقطبی براساس ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C ۱۱۹
- جدول ۴۰-۴- آزمون T در بررسی ارتباط مصرف الکل و ابتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B و C در تمام بیماران دوقطبی ۱۲۰
- جدول ۴۱-۴- بررسی مصرف الکل در بیماران دوقطبی با و بدون سابقه خودکشی ۱۲۰
- جدول ۴۲-۴- آزمون مربع کای در بررسی ارتباط مصرف الکل و سابقه خودکشی مثبت در بیماران دوقطبی دارای اختلالات شخصیتی ۱۲۱
- جدول ۴۳-۴- بررسی ارتباط بین سابقه خانوادگی بیماری روانپزشکی و ابتلای زودهنگام به بیماری دوقطبی ۱۲۱
- جدول ۴۴-۴- ارتباط بین نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی در کل بیماران تحت مطالعه ۱۲۲
- جدول ۴۵-۴- مقایسه میانگین نمرات اختلالات شخصیت خوشه B و C در دو دسته گروه ۱ و ۲ ۱۲۳
- جدول ۴۶-۴- آزمون T در بررسی ارتباط بین میانگین نمرات خوشه B و C و گروه های ۱ و ۲ ۱۲۳

فهرست اشکال

- شکل ۱-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک جنسیت..... ۹۲
- شکل ۲-۴- نمودار سنی بیماران شرکت کننده در مطالعه..... ۹۲
- شکل ۳-۴- نمودار سنی زمان شروع بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه..... ۹۳
- شکل ۴-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت تاهل..... ۹۳
- شکل ۵-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت تحصیلی..... ۹۴
- شکل ۶-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت شغلی..... ۹۴
- شکل ۷-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک محل سکونت..... ۹۵
- شکل ۸-۴- بیماران تحت مطالعه به تفکیک سابقه خانوادگی بیماری روانپزشکی..... ۹۵
- شکل ۹-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت مصرف سیگار یا مواد مخدر..... ۹۶
- شکل ۱۰-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک مصرف یا عدم مصرف الکل..... ۹۶
- شکل ۱۱-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وجود یا عدم وجود سابقه خودکشی..... ۹۷
- شکل ۱۲-۴- بیماران شرکت کننده در مطالعه به تفکیک ابتلا به انواع اختلالات شخصیتی..... ۹۸

فهرست اختصارات و کلمات کلیدی

ANOVA: Analysis of Variance

ASPD: Anti Social Personality Disorder

AUD: Alcohol Use Disorder

BMD: Bipolar Mood Disorder

BPD: Borderline Personality Disorder

CBT: Cognitive-Behavioral Therapy

COPD: Chronic obstructive pulmonary disease

CPD: cluster C Personality Disorder

DBT: Dialectical behaviour therapy

DPD: Dependent Personality Disorder

DSM V: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition

ECT: Electroconvulsive Therapy

FH: Family History

GHQ: General Health Questionnaire

MCMI: Millon Clinical Multiaxial Inventory

MDD: Major Depressive Disorder

PD: Personality Disorder

PD-B: Personality Disorder cluster B

PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder

SA: Suicide Attempt

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

STEPPS: System Training for Emotional Predictability and Problem Solving

SUD: Substance Use Disorder

YMRS: Young Mania Rating Scale

بررسی شدت علایم و نشانه های اختلال دوقطبی ۱ در بیماران دوقطبی دارای

اختلال شخصیت خوشه B و C

چکیده

زمینه: اختلال دوقطبی هزینه های بسیاری را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر جامعه و خانواده فرد بیمار تحمیل میکند. از طرفی وجود همزمان اختلال شخصیت در بیماران روانپزشکی میتواند نشانه های بیماری، پیش آگهی و حتی مسیر درمان را هم تغییر بدهد. با توجه به شیوع بالای اختلالات شخصیت در بیماران دوقطبی و با توجه به اینکه مقایسه ای در زمینه شدت علایم و نوع اختلال شخصیت در این بیماران انجام نشده است؛ لذا مطالعه با هدف بررسی و مقایسه شدت علایم و نشانه های بیماری دوقطبی در بیماران دوقطبی نوع ۱ که دارای اختلال شخصیت از نوع خوشه B و C هستند؛ انجام گرفت.

هدف: بررسی و مقایسه شدت علایم و نشانه های اختلال دوقطبی نوع ۱ در بیماران دوقطبی دارای اختلالات

شخصیتی خوشه B و C

مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه هدف، افراد با اختلال دوقطبی

نوع ۱ مراجعه کننده به درمانگاه و کلینیکهای روانپزشکی شهر اردبیل در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودند که بر اساس

ارزیابی انجام گرفته همبودی با اختلال شخصیت خوشه B یا C داشتند. با روش هدفمند و با لحاظ معیارهای

ورود به مطالعه، تعداد ۷۷ نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های دموگرافیک و میلون و

مانیای یانگ استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده ها ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها انجام و آزمون تی برای

دو گروه مستقل و آزمون همبستگی پیرسون و کواریانس انجام شد.

نتایج: رابطه مستقیم و معناداری بین میانگین نمرات اختلالات شخصیتی خوشه B در بیماران دوقطبی با اختلال شخصیت خوشه B و نمره مانیای یانگ و نمره طیف دوقطبی وجود داشت. ($p < 0/001$) همچنین بین میانگین نمرات اختلالات شخصیتی خوشه C با نمره آزمون مانیای یانگ در بیماران دوقطبی دچار اختلال شخصیت خوشه C رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. ($p = 0/030$) در مقایسه شدت مانیا در بیماران اختلال دوقطبی همراه با اختلالات شخصیتی خوشه B و C براساس آزمون T-test با وجود بالاتر بودن نمرات آزمون مانیای یانگ در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه B نسبت به بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه C تفاوت معناداری بینشان مشاهده نگردید. اما در بررسی نمره طیف دوقطبی تفاوت بالا و معناداری بین نمرات طیف دوقطبی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه B و C مشاهده شد. همچنین ارتباط معناداری بین سن بیماران یا وضعیت تاهلی یا جنسیت آنها با شدت علایم و نشانه های اختلال دوقطبی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: همبودی اختلالات شخصیتی خوشه B علایم فاز مانیای اختلال دوقطبی را در بیماران دوقطبی مبتلا به اختلالات شخصیتی خوشه B تشدید میکند. همچنین همبودی اختلالات شخصیتی خوشه C علایم فاز مانیای اختلال دوقطبی را در بیماران دوقطبی مبتلا به اختلالات شخصیتی خوشه C کاهش میدهد. از طرفی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که اختلال شخصیت خوشه B نیز دارند، علایم مانیای شدیدتری را نسبت به بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که اختلال شخصیت خوشه C دارند، نشان میدهند. علاوه بر این، ارتباطی بین شدت علایم فاز مانیای اختلال دوقطبی در بیماران دوقطبی مبتلا به اختلالات شخصیتی با سنین مختلف، یا جنسیت یا وضعیت تاهلی متفاوت مشاهده نگردید.

کلیدواژه ها: اختلال دوقطبی - اختلال دوقطبی نوع یک - فاز مانیا - اختلال شخصیت - اختلال شخصیت

خوشه B - اختلال شخصیت خوشه C