

بررسی شیوع سنی و جنسی سینوس پیلونیدال در ۱۴ بیمار مورد جراحی قرار گرفته شده

در بیمارستان فاطمی از سال ۸۶-۸۰

دکتر مهدی چینی فروش^۱، مریم دلداده مقدم^۲، امین باقری^۳، سمیرا متین

مقدمه و هدف

بیماری پیلونیدال یا به صورت یک سینوس، ترشح کننده ویا به شکل آبسه حاد در ناحیه کوکسیژال تظاهر می کند. یک کیست زمینه ای همراه با بافت گرانولوماتوز، فیبروز، و به طور شایع کپه های موجود دارد. بیماری پیلونیدال از زمان سلوغ نادهه سوم عمر در جنس مذکر بیشتر دیده می شود. زمانی که این سینوس ها به طور حاد دچار التهاب می شوند بیماران با شکایت درد، تورم و وجود ترشحات چرکی مراجعه می کنند.

هدف از این مقاله دانستن ارتباط دو معیار سن و جنس با شیوع بیماری پیلونیدال است.

مواد و روش

این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است. ۱۴۸ نفر مبتلا به بیماری سینوس پیلونیدال که از سال ۸۶-۸۰ در بیمارستان فاطمی اردبیل جهت جراحی بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پرونده های آزمایشات با تلوژیکی این افراد استخراج و در معیار سن و جنس مورد بررسی قرار گرفته شد. داده های تعیین شده با برنامه SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج

از ۱۴۸ بیمار مورد مطالعه، ۱۲۰ نفر (۸۷٪) مرد و ۱۸ نفر (۱۳٪) زن بودند. محدوده سنی بیماران ۴-۴۴ و میانگین سنی آنها ۲۶/۷۱ بدست آمد. از نظر شغلی تنها اطلاعات ۶۶ نفر در دسترس بود که شامل: (۶/۶ کشاورز)، (۴/۴ آزاد)، (۱/۱۲ دانش آموز)، (۱/۱۵ سرباز)، (۱/۱۲ کارگر)، (۱۲/۱۲ کارمند) می باشد.

بحث و نتیجه گیری

شیوع بیماری سینوس پیلونیدال در جنس مذکر تقریباً برابر جنس مونث می باشد و بیشترین شیوع آن در بازه های سنی ۲۴-۱۹ سال، با فراوانی ۲۵/۶۷٪ می باشد.

کلمات کلیدی: سینوس پیلونیدال، آبسه ساکرو کوکسیکس، سن و جنس