

بررسی رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

^۱ فاطمه علایی
^۲ مرضیه شهبابی
^۳ راحله محمدی لنج آبادی
^۴ دکتر حمید علوی مجد

چکیده

مقدمه: نیاز عاطفی یکی از مهمترین نیازهای کودکان می باشد که از همان ساعات اولیه بعد از تولد باید برآورده شود. کودکان به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل از تولد و پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت و محبت والدین خود هستند.

هدف: هدف از این پژوهش تعیین رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد می باشد.

مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است و نمونه های پژوهش را ۶۶ نفر از مادران در بخشهای زایمان بیمارستان مهدیه تشکیل می دهد. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، برگه مشاهده رفتارهای دلبستگی^۵، فرم اطلاعات مشخصات فردی مادران و دوربین فیلمبرداری بود. اعتبار ابزار به شیوه اعتبار محتوی و پایایی برگه مشاهده به شیوه سنجش بین مشاهده گران با $r = 0/89$ تایید شد. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: رفتارهای دلبستگی در سه گروه مراقبتی، مجاورتی و احساسی مورد بررسی قرار گرفت، یافته ها نشان داد که بیشترین رفتار در میان رفتارهای مراقبتی شیردادن به نوزاد با میانگین ۴۹/۲ درصد می باشد. در بین رفتارهای مجاورتی بیشترین رفتار مربوط به بغل کردن نوزاد با میانگین ۲۲/۹ درصد

^۱ - کارشناس ارشد پرستاری کودکان و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

^۲ - کارشناس ارشد پرستاری کودکان و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

^۳ - کارشناس ارشد پرستاری کودکان

^۴ - دکترای آمار زیستی و استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

^۵ - Attachment

می باشد. در میان رفتارهای احساسی نیز، نگاه کردن به چهره با میانگین (۶۶/۹ درصد) بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و حساسیت اولین برخورد مادر با نوزاد با انجام این تحقیق اطلاعات جامع و دسته بندی شده ای از رفتار دلبستگی (مراقبتی، مجاورتی احساس) مادران با نوزاد بلافاصله بعد از تولد بدست آمده است. نظر به اینکه پرستاران و سایر اعضا گروه بهداشت و درمان نقش خیلی مهمی در ایجاد رابطه بین مادر با نوزاد دارند، پیشنهاد می شود که مادران را تشویق به برقراری هرچه سریعتر این ارتباط نموده و آنها را از مزایای ایجاد ارتباط عاطفی با نوزاد در ساعات اولیه بعد از تولد آگاه نمایند.

واژه های کلیدی: دلبستگی، مادر، نوزاد، ارتباط اولیه

مقدمه

نوزاد با نوک انگشتان، لمس اندامهای نوزاد، لمس سر نوزاد، بوسیدن نوزاد، در آغوش گرفتن نوزاد، صحبت کردن با نوزاد، تماس چشم در چشم با نوزاد، بوکردن نوزاد، قرار دادن نوزاد در وضعیت صورت به صورت (کاسانو و ماهارا^۴ ۱۹۹۸).

مطالعه ای که توسط تیزر و همکاران^۵ انجام گرفته نشان داده است که، تماس پوست با پوست در رفتار و احساس مادرانه کاملاً مؤثر است. تماس پوستی موجب افزایش تمایلات مادر در انجام مراقبتهای لازم از نوزاد شده و موجب کاهش عوارض نارس بودن نوزاد می شود (تیزر و همکاران، ۱۹۹۸). برقراری ارتباط عاطفی بین والدین و نوزاد بر روند رشد و نمو آتی او تاثیر خواهد گذاشت بنابراین بالا بردن سطح آگاهی خانواده در مورد اهمیت برقراری ارتباط با نوزاد و مراقبتهای لازم از نوزاد می تواند گام مؤثری در تامین سلامت جسمی و روحی در کودکان

مرحله نوزادی طیف کوتاه اما بسیار مهم و بحرانی از رشد آدمی را در بر می گیرد، و رشد و تکامل عاطفی در این مرحله به طور بارز و مشخصی نمود پیدا می کند (ویلی و ونگ^۱ ۱۹۹۹). مک کنی و همکاران^۲ (۲۰۰۰) می نویسند که پیوستگی یک کشش اولیه به سمت نوزاد است که توسط والدین احساس می شود و یک زمان حساسیت بعد از تولد است که حدوداً ۶۰-۳۰ دقیقه اول بعد از تولد می باشد.

اولین ساعات زندگی یک زمان ایده آل برای تعاملات اولیه والدین و نوزاد می باشد. محققان بر این فرض هستند که ممکن است بعد از تولد زمان ویژه ای (از نظر حساسیت) وجود داشته باشد، که اگر احياناً این فرصت فراموش شود در این صورت بین والدین و نوزاد ممکن است هیچ رابطه عاطفی به وجود نیاید (دیکاسون و همکاران^۳ ۱۹۹۷). به طور کلی رفتارهایی که والدین در برخورد با نوزاد از خود نشان می دهند عبارتند از: لمس

^۱-Waly & Wong

^۲- Mckinney et al

^۳- Dickason et al

^۴ - Kussano & Maehara

^۵ - Tessier et al

باشد. با توجه به اهمیت برقراری ارتباط اولیه والدین با نوزاد و همچنین عدم وجود تحقیقات لازم در این زمینه در داخل کشور پژوهشگر بر آن شد تا مطالعه ای با عنوان بررسی رفتارهای دلبستگی مادر با نوزاد در اولین برخورد با وی انجام دهد.

مروری بر مطالعات

در مطالعه ای که کاسانو و ماھارا (۱۹۹۸) به منظور تعیین رفتارهای پیوستگی مادران نسبت به نوزاد نارس بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه روی ۱۶ مادر برزیلی و ۱۹ مادر ژاپنی انجام دادند، مشخص گردید مادران ژاپنی به طور معنی داری رفتارهای بو کردن، صحبت کردن، لمس سر نوزاد و صورت به صورت قرار دادن نوزاد را بیشتر از خودشان نشان می دهند در عوض مادران برزیلی رفتارهایی نظیر با دقت نگریستن، لمس با نوک انگشتان، لمس انتهاها، در آغوش گرفتن و لمس با کف دست را بیشتر از خودشان نشان می دهند. مادران ژاپنی بعد از هفت دقیقه که از ملاقاتشان با نوزاد سپری شد شروع به لمس نوزاد می نمایند در حالی که مادران برزیلی از همان دقایق اول ملاقات رفتارهایشان را نشان می دهند و زمان بیشتری را نیز با نوزادشان سپری می نمایند که پژوهشگر علت این امر را مربوط به مسائل و اختلافات فرهنگی ذکر می کند.

مولر^۱ (۱۹۹۶) مطالعه ای به منظور بررسی دلبستگی دوران بارداری و ارتباط آن با دلبستگی بعد از زایمان انجام داد. که به این منظور ۱۶۹ مادر باردار انتخاب شدند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بین دلبستگی دوران بارداری و بعد از

زایمان ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین وضعیت تأهل تأثیر عمده ای بر دلبستگی دارد بطوریکه در زنان بدون همسر دلبستگی دوران بارداری و بعد از زایمان نسبت به زنان شوهردار بیشتر بود. میزان تحصیلات و درآمد خانواده تأثیری بر دلبستگی بعد از زایمان نداشته، ولی به روی دلبستگی دوران بارداری تأثیر منفی داشت. سایر متغیرها (سن، تعداد حاملگی، نژاد، شغل) تأثیری بر هیچ یک از رفتارهای دلبستگی دوران بارداری و بعد از زایمان نداشتند.

مواد و روشها

نوع پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که رفتارهای مادران در اولین برخورد با نوزاد را در یکی از بیمارستانهای آموزشی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل ۶۶ نفر از مادرانی است که در مدت نمونه گیری در مرکز پزشکی آموزشی مهدیه صاحب فرزند شده اند، نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام گرفت.

ابزار گردآوری اطلاعات: برگه مشاهده شامل سه گروه رفتارهای دلبستگی می باشد که شامل رفتارهای احساسی (بوسیدن، نگاه کردن به چهره، نوازش کردن، صحبت کردن، نگاه کردن به اندامها، تکان دادن نوزاد، لبخند زدن، به اسم صدا کردن نوزاد) رفتارهای مجاورتی (بغل کردن، تماس بدنی، حلقه کردن بازوها دور نوزاد) و رفتار مراقبتی (مرتب کردن لباس نوزاد، شیر دادن به نوزاد) می باشد. اعتبار ابزار به شیوه اعتبار محتوی تعیین گردید.

^۱ - Muller

پایایی برگه مشاهده به شیوه سنجش بین مشاهده گران با $T = 0/89$ تأیید شد.

نحوه جمع آوری اطلاعات: جهت جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات فردی مادران، برگه مشاهده رفتارهای دلبستگی مادران و دوربین فیلمبرداری مدار بسته استفاده شد. جهت فیلمبرداری پس از کسب اجازه از مادر و همسرش و صدور اجازه از مرکز مهدیه اقدام شد.

هریک از مادران بعد از زایمان زمانی که برای اولین بار نوزاد خود را ملاقات می کرد به مدت ۱۵ دقیقه مورد فیلمبرداری قرار می گرفت و بعد از فیلمبرداری در صورت مساعد بودن حال مادر فرم اطلاعات فردی تکمیل می شد و سپس برگه مشاهده از روی فیلم های تهیه شده توسط پژوهشگر تکمیل می شد داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به هریک از رفتارها برحسب فراوانی و همچنین تداوم آن تا پایان ۱۵ دقیقه امتیاز تعلق گرفت و فراوانی مطلق و نسبی آنها محاسبه و با هم مقایسه می شد.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش در گروه سنی ۲۱-۲۵ سال (۴۰/۹ درصد) قرار دارند. میانگین سن ۲۶/۴ سال و انحراف معیار ۵ سال بود. سن مادر در هنگام ازدواج ۱۹-۲۳ (۴۳/۹ درصد) با میانگین ۱۹/۸ سال و انحراف معیار ۴ سال بوده، اکثریت مادران (۹۳/۹ درصد) دارای شغل خانه دار، و تحصیلاتی در حد راهنمایی و دبیرستان داشتند.

رفتار دلبستگی مادران در سه حیطه احساسی، مجاورتی و مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت امتیاز هریک از رفتارها برحسب تکرار آن محاسبه گردید. بدین معنی که به ازاء هریک بار مشاهده رفتار یک امتیاز منظور گردید. یافته ها نشان داد که بیشترین رفتار در میان رفتارهای مراقبتی شیردادن به نوزاد با میانگین ۴۹/۲ می باشد یعنی از میان میانگین رفتارها بیشترین رفتار تداوم دار تا پایان ۱۵ دقیقه فیلمبرداری مربوط به شیر دادن است. در بین رفتارهای مجاورتی بیشترین رفتار مربوط به بغل کردن نوزاد با میانگین ۲۲/۹ و کمترین میانگین ۸/۹ در همین حیطه مربوط به تماس بدنی با نوزاد می باشد. در میان رفتارهای احساسی نیز، نگاه کردن به چهره با میانگین (۶۶/۹) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است یعنی در ۶۶/۹ موارد مادران نگاه کردن به چهره جزء رفتارهای احساسی بروز داده شده قرار داشت و بعد از آن نوازش کردن نوزاد با میانگین ۱۱/۴ قرار دارد. در بین سه حیطه رفتاری نیز رفتار مراقبتی با میانگین ۲۸ بیشترین سهم و بعد از آن به ترتیب رفتارهای مجاورتی با میانگین ۱۶/۴ و رفتار احساسی با میانگین ۱۴/۹ در رده های بعدی قرار می گیرند (جدول شماره ۱).

جدول شماره (۱): فراوانی رفتارهای دلبستگی مادران با نوزادان در اولین برخورد با نوزاد در بخشهای زایمان بیمارستان آموزشی مهدیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

رتبه	نوع رفتار															زمان (دقیقه)		
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵			
۶۶/۹	۱۰۰	۹۸/۵	۹۷	۹۵/۵	۹۳/۹	۹۰/۹	۸۱/۸	۷۲/۷	۶۶/۷	۵۶/۱	۴۸/۵	۴۰/۹	۲۸/۸	۱۶/۷	۱۵/۲	۱۱/۴	نگاه کردن به	
۱۱/۴	۳۴/۸	۳۱/۸	۲۲/۷	۱۶/۷	۱۸/۲	۷/۶	۳/۰	۷/۶	۳/۰	۹/۱	۷/۶	۶/۱	۱/۵	۱/۵	۰/۰	۱۱/۴	چهره	
۲/۴	۱۲/۱	۴/۵	۴/۵	۳/۰	۶/۱	۰/۰	۱/۵	۰/۰	۰/۰	۱/۵	۰/۰	۱/۵	۰/۰	۰/۰	۱/۵	۲/۴	نوازش کردن	
۱۳/۰	۲۷/۳	۳۰/۳	۲۴/۲	۱۵/۲	۱۶/۷	۱۸/۲	۱۲/۱	۱۲/۱	۶/۱	۱۲/۱	۷/۶	۴/۵	۶/۱	۱/۵	۱/۵	۱۳/۰	بوسیدن	
۶/۲	۲۱/۲	۱۲/۱	۴/۵	۱۲/۱	۷/۶	۷/۶	۱/۵	۴/۵	۷/۶	۳/۰	۰/۰	۴/۵	۳/۰	۱/۵	۱/۵	۶/۲	صحبت کردن	
۱۰/۳	۳۷/۹	۲۲/۷	۱۸/۲	۱۵/۲	۱۰/۶	۱۸/۲	۹/۱	۶/۱	۳/۰	۶/۱	۳/۰	۴/۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱۰/۳	نگاه کردن به	
۶/۹	۱۳/۶	۱۰/۶	۹/۱	۹/۱	۱۳/۶	۶/۱	۷/۶	۶/۱	۷/۶	۶/۱	۶/۱	۳/۰	۴/۵	۳/۰	۱/۵	۶/۹	اندام	
۲/۴	۱۰/۶	۳/۰	۶/۱	۱/۵	۰/۰	۴/۵	۴/۵	۳/۰	۰/۰	۳/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۲/۴	لبخند زدن	
۱۴/۹	۳۲/۲	۲۶/۷	۲۳/۳	۲۱/۰	۲۰/۸	۱۹/۱	۱۵/۲	۱۴/۰	۱۱/۷	۱۲/۱	۸/۵	۸/۱	۵/۵	۳/۰	۲/۷	۱۴/۹	تکان دادن	
																	به اسم صدا	
																		کردن
																		جمع

ادامه جدول شماره (۱): فراوانی رفتارهای دل‌بستگی مادران با نوزادان در اولین برخوردها با نوزاد در بخشهای زایمان بیمارستان آموزشی مهدیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

زمان (دقیقه)	نوع رفتار				رفتارهای دل‌بستگی (درجه ۱ تا ۴)				رفتارهای دل‌بستگی (درجه ۵ تا ۸)				جمع کل رفتارها	
	بغل کردن	تماس بدنی	حلقه کردن بازوها	جمع	موتب کردن	لیاس	شیر دادن	جمع	موتب کردن	لیاس	شیر دادن	جمع		
۱	۳۱/۸	۲۷/۳	۲۴/۲	۲۷/۸	۱۳/۶	۹/۱	۳۷/۹	۲۵/۸	۲۷/۸	۹/۱	۲۴/۴	۳۷/۹	۲۵/۸	۸۵/۷
۲	۳۱/۸	۲۵/۸	۲۵/۸	۲۷/۸	۹/۱	۹/۱	۲۴/۴	۲۵/۸	۲۷/۸	۹/۱	۲۴/۴	۳۷/۹	۲۵/۸	۸۰/۲
۳	۳۴/۸	۱۹/۷	۲۴/۲	۲۶/۳	۹/۱	۹/۱	۵۹/۱	۳۴/۱	۲۶/۳	۹/۱	۵۹/۱	۳۴/۱	۳۴/۱	۸۳/۶
۴	۳۶/۴	۱۲/۱	۲۵/۸	۲۴/۷	۱۳/۶	۱۳/۶	۶۸/۲	۴۰/۹	۲۴/۷	۱۳/۶	۶۸/۲	۴۰/۹	۴۰/۹	۸۶/۷
۵	۳۱/۸	۱۰/۶	۲۷/۳	۲۳/۲	۱۰/۶	۱۰/۶	۶۸/۲	۳۹/۴	۲۳/۲	۱۰/۶	۶۸/۲	۳۹/۴	۳۹/۴	۸۳/۵
۶	۲۸/۸	۱۰/۶	۲۴/۲	۲۱/۲	۷/۶	۷/۶	۷۴/۲	۴۰/۹	۲۱/۲	۷/۶	۷۴/۲	۴۰/۹	۴۰/۹	۸۱/۳
۷	۲۷/۳	۳/۰	۲۱/۲	۱۷/۲	۴/۵	۴/۵	۷۴/۲	۳۹/۴	۱۷/۲	۴/۵	۷۴/۲	۳۹/۴	۳۹/۴	۷۱/۷
۸	۲۵/۸	۴/۵	۱۹/۷	۱۶/۷	۹/۱	۹/۱	۷۱/۲	۴۰/۲	۱۶/۷	۹/۱	۷۱/۲	۴۰/۲	۴۰/۲	۷۰/۸
۹	۲۲/۷	۹/۱	۱۹/۷	۱۷/۲	۷/۶	۷/۶	۶۵/۲	۳۶/۴	۱۷/۲	۷/۶	۶۵/۲	۳۶/۴	۳۶/۴	۶۵/۳
۱۰	۱۹/۷	۶/۱	۱۵/۲	۱۳/۶	۳/۰	۳/۰	۵۱/۵	۲۷/۳	۱۳/۶	۳/۰	۵۱/۵	۲۷/۳	۲۷/۳	۵۳/۰
۱۱	۱۸/۲	۴/۵	۱۳/۶	۱۲/۱	۳/۰	۳/۰	۴۰/۹	۲۲/۰	۱۲/۱	۳/۰	۴۰/۹	۲۲/۰	۲۲/۰	۴۲/۶
۱۲	۱۵/۲	۰/۰	۹/۱	۸/۱	۳/۰	۳/۰	۳۱/۸	۱۷/۴	۸/۱	۳/۰	۳۱/۸	۱۷/۴	۱۷/۴	۳۳/۶
۱۳	۱۰/۶	۰/۰	۷/۶	۶/۱	۶/۱	۶/۱	۲۵/۸	۱۵/۹	۶/۱	۶/۱	۲۵/۸	۱۵/۹	۱۵/۹	۲۷/۵
۱۴	۴/۵	۰/۰	۱/۵	۲/۰	۱/۵	۱/۵	۱۶/۷	۹/۱	۲/۰	۱/۵	۱۶/۷	۹/۱	۹/۱	۱۴/۱
۱۵	۴/۵	۰/۰	۰/۰	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱۰/۶	۶/۱	۱/۵	۱/۵	۱۰/۶	۶/۱	۶/۱	۱۰/۲
توسط	۲۲/۹	۸/۹	۱۷/۳	۱۶/۴	۹/۶	۹/۶	۴۹/۲	۲۸/۰	۱۶/۴	۹/۶	۴۹/۲	۲۸/۰	۲۸/۰	۵۹/۳

بحث و نتیجه گیری

یافته های این پژوهش نشان می دهد که اکثریت مادران در حیطه احساسی نگاه کردن به چهره نوزاد را از خود نشان دادند که این رفتار می تواند در تعامل مادر و نوزاد جزء مهم ترین عوامل ارتباط عاطفی و احساسی محسوب شود. در پژوهش وکیلان (۱۳۷۶) نیز بیشترین رفتار در میان رفتارهای احساسی، نگاه کردن به نوزاد عنوان شده است.

در بین رفتارهای مجاورتی، در این پژوهش بغل کردن نوزاد بیشترین رفتاری بوده که مادران در برخورد با نوزاد از خود نشان دادند. در پژوهش وکیلان (۱۳۷۶) نیز بیشترین رفتار در میان رفتارهای مجاورتی مربوط به بغل کردن نوزاد می باشد.

در بین رفتارهای مراقبتی در این پژوهش بیشترین رفتار، شیردادن به نوزاد می باشد. در پژوهش وکیلان (۱۳۷۶) در میان رفتارهای مراقبتی مرتب کردن لباس نوزاد رفتاری بوده که مادران بیشتر از سایر رفتارها از خود نشان داده اند.

دشاتو و ویبرگ^۱ (۱۹۷۷) نیز در تحقیق خود در همین زمینه به این نتیجه رسیدند مادرانی که پس از تولد تماس بیشتری با نوزاد خود داشتند نسبت به گروهی که تماس نداشتند رفتارهایی مثل حلقه زدن بازوها دور نوزاد، وضعیت چهره به چهره را بیشتر از خودشان نشان می دادند. اما از نظر آماری اختلاف بین این دو گروه معنی دار نبوده است.

با انجام این تحقیق اطلاعات جامعی از رفتارهای دلبستگی مادر با نوزاد بلافاصله پس از تولد در کشورمان (با

ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاص) بدست آمده است. نظر به اهمیت دلبستگی مادر به نوزاد و تأثیر آن در احساس کفایت مادری و تجربه خوشایند آن به ویژه برای مادران جوان لزوم ایجاد ارتباط اولیه باید به آنان یادآور شود. با آموزش این رفتارها به کارکنان بهداشتی بویژه پرستاران و ماماها و همچنین والدین قبل از تولد نوزاد می توان در جهت ارتقاء روابط والدین با نوزاد اقدامات اساسی را به عمل آورد. در صورت تثبیت شدن این نوع رفتارها در تمامی مادران می توان امیدوار بود که در آینده افراد جامعه از بهداشت روانی مناسب تری برخوردار باشند و ناهنجاری های رفتاری در سنین بالاتر کاهش یابد.

با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود پرستاران و سایر اعضاء گروه بهداشت و درمان که به هر ترتیبی با مادر و نوزاد ارتباط دارند، باید زمان بیشتری را در اختیار مادران قرار داده و عملاً به این مهم پرداخته شود تا در لحظات اولیه بعد از تولد ارتباط بیشتری با نوزاد خود برقرار نمایند.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از کلیه همکارانی که در این پژوهش یاری نمودند، به ویژه سرپرستار بخش دو بیمارستان مهدیه سرکار خانم انوری صمیمانه تشکر می گردد.

^۱ - Dechateau & Wiberg

- وکیلان ک (۱۳۷۶) بررسی تاثیر تماس بلافاصله پس از زایمان بین مادر و نوزاد بر رفتارهای دلبستگی زنان نخست زا در زمان شیر دادن قبل از ترخیص، یک ماه و سه ماه بعد از تولد در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران، *پایان نامه کارشناسی ارشد*. رشته مامایی. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران.

- Dickason, E.J et al (1997) *Maternal Infant Nursing Care*. 3 Edition. New York, Mosby.Co.
- Dechateau S & Wiberg B (1977) Long term effect on mother- infant behaviour of extra contact during the first hour postpartum, A follow up at three months. *Acta Pediatrics Scandinavia*. 66 (2) 145-151. (abstract)
- Kussano C.A & Maehara S (1998) Japanese and Brazilian maternal bonding behaviour toward preterm infant: A comparative study. *Journal of Neonatal Nursing*. 4(1) 23 - 28.
- Mckinney, E.S et al (2000) *Maternal Child Nursing*. Philadelphia. Saunders.Co
- Muller M.E (1996) Prenatal and postnatal attachment: A modest correlation. *Journal of Obstetric, Gynecology and Neonatal Nursing*. 25 (2) 161-166.
- Tesseir R et al (1998) Kangaroo mother care and bonding hypothesis. *Journal of Pediatrics*. 102(2) 1 - 8.
- Waly Lucile F & Wong Donna L (1999) *Nursing Care of Infant and Children*.6 edition, New York, Mosby.Co

Maternal attachment behaviors at first neonatal visit in a hospital affiliated to Shaheed Beheshti Medical University

Alaee, F.

Shahabi, M.

Mohammadi, R.

Alavi Majd, H.Dr.

Abstract

Background: Emotional needs are critical in children, which must be met from early hours of life.

Purpose: This descriptive study was conducted to assess maternal attachment behaviors at first neonatal visit.

Method: Subjects were 66 mothers at Mahdiyeh hospital. Data were collected by an observational checklist, an information form and video tapes. Content validity and interrater reliability were used to validate the tools and make them reliable.

Results: Breastfeeding was the most frequent caring behavior (49.2%). Hugging was mostly seen (22.9%) in adjacency behaviors. In emotional behaviors, eye to eye contact was most frequent.

Conclusion: With respect to the results, nurses and other health care workers can play an important role in the establishment of mother- infant relation.

Key words: Attachment, Mother, Neonate, First visit.