

L006

**بررسی شیوع سنی و جنسی هموروئید در ۶۲ بیمار مورد جراحی  
در بیمارستان فاطمی اردبیل از سال ۸۶-۸۰**  
دکتر مهدی جینی فروش<sup>۱</sup>، مریم دلداده مقدم، امین باقری، سمیرا متین

**مقدمه و هدف**

هموروئید توده های عروقی بزرگ شده ای در کانال مقعدی می باشد که برای قرن هاست شناخته شده می باشد و یکی از مواردی است که جراحان کولون و رکتوم با آن سر و کار دارند. تخمین بروز دقیق این وضعیت مشکل است زیرا بسیاری از مردم تمایلی به دریافت توصیه پزشکی یا مراجعه به دلایل متعدد شخصی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی ندارند. اما مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع بین ۴ درصد در بزرگسالان در امریکا تا ۳۰ درصد در لندن را گزارش می نماید. هدف از این مقاله تعیین ارتباط بین سن و جنس با شیوع بیماری هموروئید می باشد.

**مواد و روش ها**

در این مطالعه توصیفی مقطعی پرونده ۶۲ بیمار مبتلا به هموروئید که بین سالهای ۸۶-۸۰ در بیمارستان فاطمی اردبیل تحت هموروکتومی قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت. پرونده های آزمایشات پاتولوژیکی این افراد استخراج و دو معیار سن و جنس مورد بررسی قرار گرفته شد. داده های تهیه شده با برنامه spss مورد آنالیز قرار گرفت.

**نتایج**

از ۶۲ بیمار هموروئید کتومی شده مورد بررسی ۷۳٪ مذکر و ۲۷٪ مونث بودند. محدوده سنی بیماران ۲۰-۶۵ سالگی بوده و میانگین سنی آنها ۴۰/۲ سال بدست آمد. شایع ترین علایم عبارتند از: تب با ۸۳/۳٪ بیوست با ۶۲٪ و در زنان ۴۰٪ آنها با سابقه زایمان بالای ۳ بار داشتند.

**بحث و نتیجه گیری**

بررسی اخیر نشان میدهد که در جنس مذکر تقریباً ۳ برابر شایعتر بوده و بازه سنی شایع ۲۵-۲۰ سالگی می باشد.

کلمات کلیدی: هموروئید داخلی، هموروئید خارجی، ترومبوز، هموروئید کتومی

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.