




دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی



پایان نامه:

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی

عنوان:

بررسی شیوع عوامل خطرساز و وضعیت کنترل دیابت در ۴۴
کودک مراجعه به کلینیک دیابت بیمارستان علی‌اصغر(ع) اردبیل

استاد راهنمای: سرکار خانم دکتر لیدا محمودی

(دارای بورد تخصصی بیماریهای کودکان)

نگارش: حسن گنجی

(دانشجوی رشته پزشکی ورودی ۷۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

سال تحصیلی: ۱۳۷۸-۷۹ شماره پایان نامه: ۰۰۸



بنام خدای بخشنده مهربان

هر که کار طبابت برگزیند باید از خدا بترسد و خیرخواه بیمار باشد و در درمانش تلاش کند.

«حضرت علی (ع)»

سرمایه عمر آدمی یک نفس است
این یک نفس از برای یک هم نفس است
با همنفی گر نفی بنشینی
مجموع حساب، آن یک نفس است

«طوسی»

تقدیم به

استاد محترم و دانشمندم:

سرکار خانم دکتر محمودی و جناب آقای دکتر غفوریان

شاکر و سپاسگزارم از اینکه ایزد عزوجل قوت و توان آن را بخشد تا با ارشاد و راهنمائی اساتید بزرگوار پایان نامه فوق را تنظیم نمایم و ارزانی دارم آن را برای دانشجویان، دانش پژوهان و کلیه کسانی که عاشق راستین علم و دانش هستند.

با آرزوی توفيق و قدردانی از کلیه کسانی که مرا آموختند.



تقدیم به

دو نازنین: پدر و مادر

بخصوص تقدیم به روح پاک و ملکوتی مادر عزیزم

که مدت مديدة است چراغ زندگی و خانه ام خاموش گشته

و از وجود روشنی، گرمی بخش و پرمهوش بی نصیب مانده ام

ولی همیشه زنده و فراموش نشدنی در خاطرم

روحش شاد

تقدیم به

دو نازنین: پدر و مادر

بخصوص تقدیم به روح پاک و ملکوتی مادر عزیزم

که مدت مدیدی است چراغ زندگی و خانه ام خاموش گشته

و از وجود روشنی، گرمی بخش و پر مهرش بی نصیب مانده ام

ولی همیشه زنده و فراموش نشدنی در خاطرم

روحش شاد

تقدیم به

همسر مهربان،
مشوق، تکیه گاه و یار و یاورم

فرزندان عزیز و مهربانم

که متتحمل زحمات بیشتری شدند
اما در کنارم به زندگی معنی، زیبائی و امیدواری بخشیدند
عطوفت و مهربانی در دل

و

تقدیم به

برادران و خواهران خوب و فداکارم

که وجودشان مایه قوت قلب بوده و هست

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه (Introduction)
۲	چکیده Abstract
فصل اول	
۰	دیابت فندی Diabetes Mellitus
۵	طبقه‌بندی Classification
۷	دیابت تیپ یک (Juvenile onset Diabetes)
۸	اپیدمیولوژی
۹	اتیولوژی و پاتوژن
۱۰	پاتوفیزیولوژی
۱۷	تظاهرات بالینی
۱۸	علام آزمایشگاهی
۱۸	تشخیص دیابت ملیتوس
۲۰	کتواسیدوز دیابتی
۲۱	پاتوفیزیولوژی DKA
۲۱	آثار عوارض کتواسیدوز دیابتی
۲۲	درمان
۴۵	پیش‌آگهی Prognosis
۴۸	بیماریهای همراه با دیابت Disease associated with diabetes
۴۹	سندرمهای ژنتیکی در ارتباط با دیابت
۴۹	هیپوگلیسمی و دیابت

فصل دوم

۵۳	Materials & Methods
۵۴	نتایج (Results)
۵۹	بحث Discussion
۶۱	نتیجه گیری Conclusion
	منابع

حمد و سپاس پروردگاری را که به بندۀ خود توفيق کمال داده است.

مقدمه (Introduction):

از آنجائیکه دیابت یک بیماری شایع اندوکرین در دنیاست و به نظر می‌رسد در جامعه ما هم شیوع بیشتری داشته باشد. این بیماری با اختلالات متابولیکی منجر به عوارض مختلفی می‌گردد که برای بیمار و خانواده وی مشکل ساز و رنج‌آور می‌باشد، و همچنین تأثیرات مثبت درمان با انسولین در کاستن عوارض بستگی به تنظیم دقیق دوز انسولین و چک مرتب و دقیق قند خون و رژیم غذایی مناسب و کاربرد صحیح آن دارد. علاوه بر این با رواج اندازه گیری قند خون در منزل بیماران می‌توانند مسئولیت را زیر نظر پزشک معالج به عهده گیرند. از طرفی در صورت عدم کنترل صحیح و درمان مناسب داروئی و غذائی نه تنها خانواده متحمل هزینه بیشتری می‌شود. بلکه موربیدیتی و مورتالیتی آن هم بالا می‌رود. از این نظر که اکثر بیماران به احتمال بیشتر ساده انگاری نموده و اهمیت نمی‌دهند و این منجر به اثرات ناهنجار روحی و روانی با توجه به سطح فرهنگ مردم در خود و خانواده بیمار می‌گردد. لذا در صدد آن برأوردنایم که شیوع عوامل خطرساز و نحوه کنترل دیابت در کودکان مراجعه به بیمارستان علی اصغر(ع) اردبیل را با نظر استاد محترم راهنمای و با بهره گیری از کتب مرجع تحت بررسی قرار داده و نتایجی را برآورد نمائیم که به موقع راه‌گشایی در حل مشکلات این بیماران بوده و آموزش‌های لازم نیز بعمل آید تا شاید بتوانیم دین خودمان را به مردم شریف اداء کرده باشیم و همچنین این رساله بعنوان منبع علمی مورد استفاده عاشقان راستین علم و دانش جهت ارتقاء و مداوای بیماران قرار گیرد.

انشاء الله



چکیده Abstract

هدف از این مطالعه «بررسی شیوع عوامل خطرساز و وضعیت کنترل دیابت» بود که در ۴۴ کودک مراجعه به کلینیک دیابت بیمارستان علی اصغر(ع) اردبیل در سال ۷۸-۷۹ انجام گرفت که از این تعداد ۳۴ کودک سابقه چند ساله با حداقل یک سال و حداقل ۸ سال و ۱۰ کودک در مدت زمان مطالعه کشف گردید که مدت زمان این پروتکل حداقل ۶ ماه بود. مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و روش تجزیه و تحلیل از نوع SPSS می‌باشد که با تکوین و تشکیل پرسشنامه از روی پرونده بیماران با معیار قرارگرفتن یک سری پارامترهای مختلف اعم از جنس، سن و فصل شروع، نوع انسولین و دفعات تزریق، تاریخچه خانوادگی، سابقه عفونت و بیماری خاص، سکونت و علت بستری ... انجام پذیرفت. در این مطالعه بیشترین Case دیابتی در شهر و روستا دختران بودند و دیگر یافته مهم دو پیک سنی که پیک اول ۱۵-۱۱ سالگی و پیک دوم ۱۰-۶ سالگی بود و در این دو پیک سنی بیشتر بیماران مؤنث بودند.

دیگر اینکه زیر ۵ سال بندرت دیده می‌شود در این مطالعه فقط یک بیمار زیر ۵ سال وجود داشت که پسر ۴ ماهه با تشخیص Sepsis در فصل تابستان بستری که طی درمان تشخیص مسجل گردید حدود ۷۵٪ بیماران ۱-۲ بار بستری داشتند که بیشتر مؤنث بودند. نکته دیگر در ۸۰٪ بیماران که با اولین علامت به این مرکز مراجعه و شناخته شده‌اند شامل پلی اوری پلی دیپسی و پل فازی بودند ۴۴٪ بیماران وضع اقتصادی خوبی داشتند که معنی دار به نظر نمی‌رسد. ۷۳٪ بیماران تاریخچه خانوادگی دیابت منفی بود. فقط ۲۷٪ تاریخچه فامیلی مثبت داشتند.

۹۳٪ بیماران تاریخچه از عفونت ویروسی نداشتند در حالکه فقط ۷٪ بیماران عفونت ویروسی داشتند در ۸۳٪ بیماران عامل مستعد کننده وجود نداشت به نظر مسئله ایدیوپاتیک مطرح باشد.

۶۰٪ بیماران تاریخچه بستری بدلیل هیپرگلیسمی یا DKA و ۴۰٪ بیماران به علت هیپوگلیسمی داشتند که بیشتر آنها مؤنث بودند. در ۸۶٪ موارد BMI زیر نرمال داشتند که بیشتر دختر بودند. ۵۰٪ بیماران از نظر قد نسبت به سن-جنس زیر نرمال بودند.

۴۶٪ بیماران انسولین بین ۱۸-۲۵/Kg دستگیر شدند که بیشتر آنها BMI زیر نرمال داشتند.

۷۳٪ بیماران انسولین را بصورت two daily injection دریافت می‌کردند که از نوع NPH و ریگولار بود. در ۲۳٪ بیماران بیماری همراه مشتمل بر هیپرتابسیون هیپوتیروئیدی، تالاسمی، هپاتیت و UTI بود. در ۴۱٪ موارد بیماری در فصل پاییز و ۲۵٪ در فصل زمستان شروع شده بود. در ۳۲ بیمار هموگلوبین گلیکوزیله چک شد که در ۷۸٪ بیماران (۲۵ بیمار) Hb A_{1c} بین ۶-۹٪ که در محدوده «کنترل خوب» قرار می‌گیرد و در ۷ بیمار (۲٪) بین ۹-۱۲٪ بود که در محدوده «کنترل خوب» قرار می‌گیرند. نتیجه اینکه بیشترین موارد بیماری و غالب بستری در بیمارستان در دختران بوده و لازم است بیشتر تحت مراقبت قرار گیرند و آموزش‌های لازم در مصرف انسولین، سبک زندگی، دادن آگاهی و اطلاعات کافی درباره بیماری مدنظر باشد و آگاهی لازم به والدین داده شود. در صورت مشاهده علایم کلاسیک دیابت بخصوص آنها باید که تاریخچه فامیلی دیابت دارند و همچنین بروز بیماریهای مختلف بویژه عفونت ویرال سریعاً به پزشک مراجعه بررسی و درمان شوند. در مطالعهٔ ما علت بیماری دقیقاً شناخته شده نیست و به نظر می‌رسد عوامل ارثی و محیطی در ایجاد و بروز آن دخیل باشد. در تشخیص بیماری تست اسکرینینگ وجود ندارد و فعلاً آنالیز HLA نیز مقرن به صرفه نمی‌باشد.

فصل ١





دیابت قندی :Diabetes Mellitus

دیابت شیرین سندرومی است با اختلالات هموستاز انرژی در اثر کمبود انسولین که باعث متابولیسم ابnormal کربوهیدرات، پروتئین و چربی می‌شود. شایعترین اختلال اندوکرین و متابولیک در بچه‌ها و بالغین است که نتیجه مهم فیزیکی و روحی دارد. افراد مبتلا وابسته به انسولین باید هر روز انسولین دریافت کنند و از نظر متابولیکی، و از نظر تغذیه نیز بررسی شوند.

در اثر اختلالات متابولیکی کمپلیکاسیون‌های طولانی مدت که در اثر ابتلا عروق کوچک و بزرگ ایجاد می‌شود، بروز می‌کند، که شامل رتینوپاتی، نفروپاتی، نوروپاتی، بیماری ایسکمیک قلبی و انسداد عروق با گانگرن انتهای است.

علایم بالینی حاد را می‌توان با بررسی در مورد ترشح و عمل انسولین کاملاً مشخص کرد. بررسی ژنتیک و اتیولوژی نشان دهنده مکانیسم اتوایمیون به عنوان عامل ایجاد کننده دیابت تیپ ۱ است. دیابت تیپ اشایعترین نوع دیابت که در دوران کودکی رخ می‌دهد بخاطر تخریب اتوایمیون پانکراس می‌باشد. این بیماران از نقصان شدید و معمولاً دائمی انسولین رنج می‌برند، و برای ادامه حیات خود و پیشگیری از وقوع موارد خطرناک کتواسیدوز نیاز به انسولین دارند.

طبقه‌بندی :Classification

دیابت ملیتوس یک بیماری تنها نیست بلکه یک گروه هetroژن است که در آن شکل‌های خاص ژنتیک همراه با اتیولوژیهای مختلف و مکانیسم‌های پاتولوژیک مختلف باعث عدم تحمل به گلوکز می‌شود. طبقه‌بندی دیابت در تمام دنیا قابل قبول است. سه شکل اصلی دیابت و فرم‌های متعدد عدم تحمل کربوهیدرات تشخیص داده شده است که به ۲ نوع تقسیم‌بندی مجزا اشاره می‌شود.