



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

### پایان نامه :

برای دریافت درجه دکترای حرفه ای

در رشته پزشکی

عنوان :

بررسی توزیع سنی عوارض حاملگی در مادران حامله  
مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی

بیمارستان علوی اردبیل

(فروردين لغایت شهریور ماه ۱۳۸۰)



استاد راهنمای:

**خانم دکتر فریبا کوهنده‌وئی اقدم**

پژوهش و نگارش :

**سوسن فردی**

سال تحصیلی ۱۳۸۰-۸۱

شماره پایان نامه: ۰۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



## سوگند نامه پزشکی (اعلامیه ژنو ۱۹۴۷)

هم اکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم با خود عهد می بندم  
که زندگیم را یکسره وقف خدمت به بشریت نمایم.

احترام و تشکر قلبی خود را به عنوان دین اخلاقی و معنوی به پیشگاه  
اساتید محترم تقدیم می دارم و سوگند یاد می کنم این وظیفه خود را با وجودان  
و شرافت انجام دهم اولین وظیفه من اهمیت و بزرگ شماری سلامت بیمارانم  
خواهد بود. اسرار بیمارانم را همیشه محفوظ خواهم داشت و شرافت و حیثیت  
پزشکی را از جان و دل حفظ خواهم کرد. همکاران من برادران و خواهران من  
خواهند بود. دین، ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی هیچگونه  
تأثیری در وظایف پزشکی من نسبت به بیمارانم نخواهد داشت. من در هر  
حال به زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت و هیچگاه معلومات  
پزشکی ام را بر خلاف قوانین بشری و اصول انسانی بکار نخواهم برد.

آزادانه به شرافت خود سوگند یاد می کنم آنچه را قول داده ام انجام دهم.

تقدیم به:

## پدر بزرگوارم

که ایمان و استقامت را به من آموخت  
باشد که امین آموخته هایش باشم

تقدیم به:

## مادر مهربانم

که عشق و صداقت را به من آموخت  
باشد که قطره ای از دریای  
بیکران عاطفه اش باشم

تقدیم به:

## همسر عزیزم

که با همیگر ترانه عشق و  
بودن را سروдیم،  
باشد که همسفری خستگی ناپذیر  
برایش باشم.

تقدیم به:

## آاله خوبم

که ثمره عشقی پاک و زیباست،  
باشد که در شکفتن گل وجودش  
و پیمودن راهی که برمی گزیند  
یاریگرش باشم.

تقدیم به:

## تمامی پویندگان علم و دانش

که ضامن سعادت بشری هستند،  
باشد که در جرگه آنان قرار گیرم.

تقدیم به:

## تمامی بیماران

که طب را بر بالین دردمنشان آموختم  
باشد که مرهمی بر زخمهاشان باشم.

و

تقدیم به:

استاد گرامی خانم دکتر فریبا کوهنمودی اقدم

که با راهنمائی هایشان

مرا در این راه یاری کردند.

## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

۱	چکیده ( Abstract )
۲	<b>فصل اول: کلیات</b>
۳	مقدمه ( Introduction )
۴	حاملگی در نوجوانان (Teenagers)
۵	اثرات سن بر روی نتیجه حاملگی
۶	حاملگی پس از ۳۵ سالگی
۷	عوارض حاملگی برای مادر
۸	پره اکلامپسی ( Preeclampsia )
۹	اکلامپسی ( Eclampsia )
۱۰	دکولمان جفت ( Placental Abruption )
۱۱	جفت سرراهی ( Placental Previa )
۱۲	خونریزی پس از زایمان (Post Partum Bleeding)
۱۳	سقط ( Abortion ) سه ماهه اول بارداری
۱۴	تهدید به سقط ( Threatened abortion )
۱۵	سقط عفونی ( Infectious Abortion )
۱۶	شوك عفونی ( Septic Shock )
۱۷	نارسایی حاد کلیه ( Acute Renal Failure )
۱۸	زایمان زودرس ( Preterm Delivery )
۱۹	زایمان دیررس ( Post term Delivery )
۲۰	پارگی زودرس کیسه آب ( PROM )
۲۱	مرگ جنین داخل رحمی ( IUFD )

## عنوان

## صفحه

- ۳۶ ..... هیدر آمینوس ( Hydramnous )
- ۳۹ ..... اولیگوھیدر آمینوس ( Oligohydramnous )
- ۴۱ ..... هیپوبلازی ریه : حاملگی خارج رحمی ( Ectopic Pregnancy )
- ۴۷ ..... پیلونفربیت حاد حاملگی ( Acute Pyelonephritis )

## فصل دوم: مواد و روشهای

- ۵۱ ..... مواد و روشهای ( Materials & Methods )
- ۵۳ ..... نمونه پرسشنامه
- ۵۴ ..... فصل سوم: نتایج
- ۶۵ ..... فصل چهارم: نمودارها
- ۷۱ ..... فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
- ۷۲ ..... نتیجه گیری
- ۷۵ ..... بحث ( Discussion )
- ۷۷ ..... منابع ( References )

### چکیده (Abstract)

این تحقیق شامل بررسی توزیع سنی عوارض حاملگی ۱۴۲۸ مادر حامله مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل به صورت گذشته نگر<sup>۱</sup> از تاریخ ۸۰/۶/۲۱ لغایت ۸۰/۱/۱ می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از این تحقیق:

- \*شایعترین عارضه حاملگی بدون در نظر گرفتن محدوده سنی مادران حامله سقط سه ماهه اول بارداری و پره اکلامپسی می باشد.
- \*با در نظر گرفتن محدوده سنی شایعترین عارضه برای سنین:
  - ۱۵-۱۹ سال ... پیلونفریت
  - ۲۰-۲۴ سال ... CPD
  - ۲۵-۲۹ سال ... زایمان دیررس
  - ۳۰-۳۴ سال ... زایمان دیررس
  - ۳۵-۳۹ سال ... بریچ
  - ۴۰ سال به بالا ... بریچ می باشد.



# فصل اول

# کلیات

### (Introduction) مقدمه:

در اکثر کشورهای صنعتی، علل عمدۀ مرگ در دهه دوم زندگی شامل تصادفات وسایل نقلیه، سایر صدمات و جراحات، خودکشی و قتل می باشند. ولی در تعداد زیادی از کشورهای در حال پیشرفت، مرگ و میر مادران هنوز هم از سه علت عمدۀ مرگ در نوجوانان می باشد. اکثریت این مرگ ها بعلت اکلامپسی، عفونت دوره نفاس و خونریزی می باشند. بعلاوه تقریباً در تمامی کشورهایی که سقط غیر قانونی می باشد یکی از علل عمدۀ مرگ جنین سقط است که یا بعلت عفونت<sup>۱</sup> یا خونریزی موجب مرگ مادر می گردد.

### حاملگی در نوجوانان (Teenagers)

از دهه ۱۹۸۰ تاکنون افزایش مداوم میزان موالید در زنان زیر ۲۰ سال مربوط به افزایش تعداد نوجوانانی است که از نظر جنسی فعال می باشند در نزد زنان ۱۵ ساله تعدادی از آنان که از لحاظ جنسی فعال می باشند از ۱۷ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این رقم نزد زنان ۱۷ ساله از ۳۶ درصد به ۵۱ درصد رسیده است بنابراین تعداد فزاینده ای از نوجوانان در معرض حامله شدن قرار گرفته اند.

در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته ایالات متحده دارای میزان حاملگی، میزان موالید و میزان سقط بالاتری در بین جمعیت نوجوان خود است به نظر می رسد که