

بررسی فاکتورهای مرتبط با نوع زایمان در بیمارستانهای دولتی اربیل سال ۸۸

افروز مردی، مهناز آذری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده بهداشت.

مقدمه: هدف از علم زایمان پایان یافتن دوره حاملگی با سلامتی مادر و جنین است. بر این اساس وضع حمل معمولاً به صورت زایمان طبیعی و بر حسب نیاز به طریقه سزارین انجام می‌شود. سزارین گرچه اغلب اوقات جان مادر و نوزاد را نجات می‌دهد لکن خالی از خطر نبوده و عوارض متعددی بدنبال دارد.

مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده جامعه پژوهش کلیه زنان بارداری بود که جهت زایمان به بیمارستانهای دارای زایشگاه شهر اردبیل مراجعه کردند. تعداد ۷۶۰ نفر با روش نمونه‌گیری آسان و غیر تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در مجموع از ۷۶۰ زایمان ۳۹۵ نفر (۵۱/۹٪) تحت عمل سزارین قرار گرفتند اکثریت زنان (۳۶/۷٪) در گروه سنی ۲۵ - ۲۰ سال، ۴۵/۹٪ حاملگی اول و ۷۷/۹٪ ترم بودند. شایع‌ترین علت سزارین (۴۴/۱٪) علل جنینی، (۴۲/۲٪) علل مادری و (۱۱/۱٪) علل مشترک مادری و جنینی داشتند. از علل مادری (۶۰/۴٪) سزارین تکراری، از علل جنینی (۳۱/۱٪) برادیکاردی و از علل مشترک (۱۱/۲٪) عدم تطابق سر و لگن بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع زایمان با عواملی چون سن، تحصیلات مادر، شغل، تعداد حاملگی، محل زندگی و محل زایمان ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی به موقع برای کاهش سزارین و مجهز نمودن بیمارستان‌ها به امکانات لازم برای زایمان آسان و طبیعی از راهکارهایی است که هر چه سریع‌تر باید مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: سزارین، زایمان طبیعی، عوامل موثر.