

موکو اپیدرموئید کارسینوما داخل استخوانی

Low Grade: گزارش مورد

دکتر میر مهدی چینی فروش اصل * محسن شکراللهی **

* استادیار گروه پاتولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

** دانشجوی پزشکی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

خلاصه

سابقه و هدف: موکوپیدرموئید کارسینوما غدد بزاقی ، یک تومور کاملا شناخته شده است که حدود 5 تا 8 درصد کل تومور های غدد بزاقی را تشکیل می دهد درمان اصلی این ضایعات جراحی رادیکال و رادیوتراپی بعد از عمل است پروگنوز بیماری خوب است هدف از این گزارش معرفی خانمی است که با تومور در فک بالا و استخوان پیشانی مراجعه کرده است.

گزارش مورد: بیمار خانم 34 ساله وسفید پوست است که با تورم وسیع در دو طرف صورت و پیشانی و بدون درد به بیمارستان فاطمی مراجعه کرده است طبق گفته ی همراهان بیمار و سوابق پزشکی وی قبلا با تشخیص ACC & BCC مورد رزکسیون جراحی قرار گرفته است ولی ضایعه به این درمان ها هیچ گونه پاسخی نداده و ابعاد تورم رفته رفته افزایش یافته است . بیمار سابقه ی بیماری قبلی و فامیلی ذکر نمیکند تست آزمایشگاهی در محدوده ی نرمال بوده اند . جهت تشخیص قطعی یک incisional biopsy از استخوان اربیت و پیشانی انجام گرفت که نتیجه ی بررسی هیستوپاتولوژیک موکوپیدرموئید کارسینوما گزارش شد در بررسی مقاطع میکروسکوپی مخلوطی از سلول های ترشح کننده ی موکوس و سلولهای اپیدرموئید با سلول های اسکواموس در بستر استخوان مشهود بود.

واژه های کلیدی: موکو اپیدرموئید کارسینوما ، Low grade، کارسینوما ی غدد بزاقی



کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل



کمیته تحقیقات دانشجویی



کمیته دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

