

ارزیابی مقادیر سرمی مس در بیماران لوسمی

نویسنده‌گان: محمد مأذنی باویل علیایی، علی نعمتی کرکرق، علی عابدی
نشانی: اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - رویرویی دریاچه شورابیل
دانشکده پیراپزشکی

مقدمه: مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مقادیر سرمی مس در سرطانهای مختلف مثل کارسینومای تخدمان و کبد، سرطان ریه، پستان، سرويکس و لوسمی افزایش پیدا می‌کند. بعضی از این مطالعات اشاره به مقادیر افزایش یافته مس سرم در تشخیص سرطان دارد.

مواد و روش کار: هدف از این مطالعه بررسی افزایش مس تام در سرم بیماران مبتلا به لوسمی است. به این منظور مقادیر مس تام در سرم چهار بیمار لوسمی مذکور ۴۵-۲۶ ساله بستری شده در بخش همانولوژی بیمارستان شهید مدرس تهران اندازه‌گیری شد.

نتایج: نتایج پردازش شده این مطالعه با استفاده از برنامه آماری SPSS نشان می‌دهد که مقادیر مس در این افراد ($10.5 \pm 9\mu\text{g/dl}$) نسبت به گروه کنترل ($11\mu\text{g/dl} \pm 8.7$) افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد ($P < 0.05$).

بحث: این مطالعه مقادیر بالای مس را در سرم افراد لوسمی تأیید می‌نماید ولی بعلت اینکه این مقادیر در محدوده مقادیر طبیعی ($70 - 140\mu\text{g/dl}$) است پس نمی‌تواند در تشخیص بیماری بکار رود.