

## تب راجعه کنه ای

دکتر منوچهر براک<sup>۱</sup> - دکتر عادل احدی<sup>۲</sup>

تب راجعه یک عفونت حاد منتقله از طریق ارتروپودها و ناشی از اسپیروکتی از گونه بورلیا می باشد دو تیپ بزرگ آن منتقله از طریق کنه و کک می باشد عالیم بالینی در هر دو نوع مشابه می باشد بیماری با تب های راجعه ۳ روزه، سردرد، لرز، میالژی و آرتراژی، درد شکم و به دنبال آن بهبوی و کاهش عالیم همراه است. دوره های عود با اسپیروکتی و پاسخ ایمنی بدن همراه است یک ارگانیسم ۴۰ آتنی ژن مختلف غشایی می تواند ۶ بار و یا بیشتر در عرض چند ماه عالیم را به وجود آورد بیماری در افراد مختلف می تواند عالیم متفاوت داشته و بدون درمان مرگ زیر ۵٪ می باشد. نوع شیشی در همه جای دنیا دیده می شود و به تب قحطی و تب گرسنگی مشهور است و عامل آن بورلیا رکورنتیس است. نوع کنه ای در مناطق گرمیسری و معتدل عامل انتقال آن در ایران و خاورمیانه از طریق کنه آرگاریده جنس ارونیتو دروس تولوارانی می باشد و عامل آن بورلیا پرسیکا در اردبیل استان آذربایجان شمالی می باشد محل زندگی آن اماکن مسکونی، استبله ها می باشد.

**تشخیص:** سابقه مسافرت به مناطق با شیوع بالا و عالیم بالینی تب راجعه بهترین راه مشکوک شدن به بیماری است اسمیر خون محیطی کلفت و نازک در رنگ آمیزی رایت و گیمسا وبا مشاهده در میکروسکوپ dark field می توان اسپیروکت را مشاهده کرد. رنگ آمیزی آکریدین اورنج حساس تر از رایت و گیمسا می باشد تست های سرلوژیک کمک کننده نمی باشد. روش IFA-ELISA و گاهی PCR برای تشخیص به کار می رود.

۱- فوق تخصص عفونی کودکان و دانشیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲- متخصص کودکان و استادیار گروه کودکان