

بررسی شیوع تومور کارسینوئید آپاندکتومی شده در بیمارستان فاطمی اردبیل

دکتر میر مهدی چینی فروش^۱، دکتر سراج مهاجری^۲، باپک شیرین زاده^۳

E-Mail: M.chinifroush@arums.ac.ir

^۱ نویسنده مسئول: استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی

^۲ استادیار جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

^۳ پزشک عمومی

چکیده

زمینه و هدف: تومور کارسینوئید، شایعترین تومور آپاندیس بوده و از سلولهای نوروآندوکرین منشاء می‌گیرد. ۸۰٪ موارد این تومور در دستگاه گوارش است و بر طبق برخی گزارشها شایعترین محل پیدایش آن آپاندیس می‌باشد. این نئوپلاسم در ۰/۳٪ تا ۵٪ نمونه‌های آپاندکتومی یافت می‌گردد. سن متوسط در زمان تشخیص ۳۰ سالگی بوده و این نئوپلاسم در زنان شایعتر از مردان است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سنی و جنسی تومور کارسینوئید در بیماران آپاندکتومی شده می‌باشد.

روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی جهت بررسی شیوع تومور کارسینوئید بر اساس سن و جنس بر روی ۵۶۴ نمونه آپاندکتومی انجام شده در بیمارستان فاطمی اردبیل از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۰ صورت گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه شیوع تومور کارسینوئید در نمونه‌های آپاندکتومی ۰/۱۹٪ و میانگین سنی $33/61 \pm 1/32$ سال و بیشترین میزان شیوع آن در دامنه سنی ۱۰-۱۹ سالگی، و میانگین قطر تومور $0/37 \pm 0/74$ سانتی‌متر و شیوع تومور در زنان ۳ در هزار و در مردان ۱/۳۶ در هزار بدلست آمد و تمامی تومورها در دم آپاندیس یافت شدند. این تومور با انسداد مجرای تواند آپاندیسیست حد ایجاد کند. ولی اکثرًا بطور اتفاقی در حین امتحان پاتولوژی یافت می‌گردد.

نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع تومورهای کارسینوئید آپاندیس مشابه سایر مطالعات انجام گرفته بوده و برش طولی در کلیه موارد آپاندکتومی ضروری است.

کلمات کلیدی: تومور کارسینوئید، آپاندکتومی، آپاندیسیست

دربافت: ۸۶/۱۱/۱۳ پذیرش: ۸۷/۲/۱۸

مقدمه

تومور کارسینوئید آپاندیس که در اواخر قرن نوزدهم شناخته شد، شایع‌ترین تومور موجود در آپاندیس می‌باشد و بر طبق برخی گزارشها آپاندیس شایع‌ترین محل پیدایش تومور کارسینوئید در بدن می‌باشد و اغلب به صورت تصادفی یافت می‌شود [۱].

این تومور، از منشأ سلولهای نوروآندوکرین است و به دو فرم کلاسیک و آدنوکارسینوئید می‌باشد. انواع آدنوکارسینوئید دارای تمایز غده‌ای بوده و با آدنوکارسینوم اولیه یا آدنوکارسینوم متاستاتیک اشتباه

می‌شوند. اکثر تومورهای کارسینوئید آپاندیس خوش خیم بوده و اندازه تومور عامل اصلی در تعیین نحوه درمان می‌باشد [۲]. در حدود ۸۰٪ موارد در دستگاه گوارش و بقیه موارد در دیگر اعضای بدن، از جمله ریه، تخمدان و مجرای صفراءوی نیز گزارش شده است. شیوع تومور کارسینوئید به طور کلی ۱/۵ مورد در هزار نفر ذکر شده است.

امکان بدخیمی و احتمال متاستاز در این نئوپلاسم پایین است و از طرفی قابلیت این تومور در ایجاد علایم بالینی ضعیف می‌باشد. مشکل اساسی تصمیم گیریهای درمانی

در برگه درخواست آزمایش آنها سن قید نشده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شده اند.

یافته ها

در بیمارستان فاطمی اردبیل در مدت ۶ سال گذشته ۱۳۸۰-۸۵، در مجموع ۵۶۴۴ عمل آپاندکتومی انجام شده است که بیشترین مورد آپاندکتومی انجام شده با ۲۰۳۰ نفر ۳۶٪ در گروه سنی ۲۰-۲۹ سال و کمترین مورد با ۱۵ نفر ۳٪ در گروه سنی بالای ۷۰ سال بوده است. در گروه سنی ۲۰-۲۹ سال، تعداد ۱۴۲۰ (۷۰٪) مرد و بقیه زن و در گروه سنی بالای ۷۰ سال ۱۱ نفر (۷۳٪) مرد و بقیه زن بودند.

در میان کل موارد آپاندکتومی ۱۱ مورد تومور کارسینوئید گزارش شد. بیشترین تعداد (۶ مورد)، مربوط به دهه دوم سنی بود (جدول یک) که ۳ نفر از مبتلیان مرد و ۳ نفر دیگر زن بودند.

جدول ۱. توزیع فراوانی تومور کارسینوئید در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان فاطمی اردبیل از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

گروه سنی (سال)	مونث	مذکر	جمع (نفر)
-	-	-	۰-۹
۱۰	۳	۳	۱۰-۱۹
-	-	-	۲۰-۲۹
۲۰	۱	۱	۳۰-۳۹
-	-	-	۴۰-۴۹
۱	-	۱	۵۰-۵۹
۱	-	۱	۶۰-۶۹
۱	۱	-	>۷۰
-	-	-	نامشخص
۱۱	۵	۶	جمع

از ۱۱ تومور یافت شده، ۶ مورد از آنها مونث و ۵ مورد دیگر مذکر بوده اند. بدین ترتیب نسبت جنس زن به مرد ۱/۲ بود. در کل شمار آپاندکتومی انجام شده در زنان ۱۹۷۱ و در مردان ۳۶۷۳ مورد می باشد و نسبت زن به مرد ۱/۸ بود. بیشترین شیوع سنی تومور در دهه سنی ۱۰-۱۹ سالگی می باشد. میزان شیوع تومور کارسینوئید ۳ در هزار در زنان، در مقابله ۱/۳ در هزار در مردان و میزان شیوع کلی ۲/۱۸ در هزار نفر می باشد.

بدنبال تشخیص این تومور می باشد. تومور کارسینوئید، ۴ الی ۸/۸ درصد کل تومورهای بدخیم دستگاه گوارش را تشکیل می دهد [۳].

در مطالعاتی که توسط پاپالامبروس^۱، ویکیج^۲، انجلیتی^۳ [۶] و همکاران انجام شده است، آپاندیس شایع ترین مکان تومور کارسینوئید ذکر شده است، هر چند در پاره ای دیگر از گزارشها حدود ۵۰٪ تومورهای کارسینوئید دستگاه گوارش از روده باریک منشاء گرفته و آپاندیس را دومین مکان شایع قلمداد کرده اند [۷].

این تومور ۸۵٪ کل نئوپلاسم های آپاندیس را شامل می شود. به لحاظ انسداد مجرای آپاندیس می تواند موجب آغاز پدیده التهابی گردد [۸]. در مطالعه ای که توسط کونور^۴ و همکاران [۹] بر روی ۷۹۷۰ مورد آپاندکتومی انجام شده است ۴۲ مورد تومور کارسینوئید آپاندیس گزارش شده است، که شایع ترین نحوه بروز علیم به صورت آپاندیسیت حاد بوده و تنها در ۹/۵٪ موارد با التهاب همراه نبوده است. به ندرت نحوه بروز علیم بالینی به صورت انسداد روده، توده شکمی یا خونریزی از دستگاه گوارش می باشد [۱۰]. هدف از مطالعه اخیر بررسی شیوع سنی و جنسی تومور کارسینوئید در بیمارستان فاطمی اردبیل و مقایسه آن با سایر مطالعات می باشد.

روش کار

این مطالعه به روش توصیفی، به منظور تعیین شیوع تومور کارسینوئید آپاندیس در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان فاطمی اردبیل با بررسی گزارش های پاتولوژی طی ۶ سال گذشته (۱۳۸۰-۸۵)، انجام گرفت. مواردی که از لحاظ جنسی ابهام انگیز بوده اند، از آمار حذف گردیده اند. بیماران بر حسب جنس به گروه های سنی دهگان و بالاتر از ۲۰ سال، تقسیم شده اند. گروه سنی نامشخص مختص بیمارانی است که

¹ Papalombros

² Vicic

³ Angeletti

⁴ Connor

در بررسی‌هایی که توسط رئال^۱، ویکیج و همکاران انجام گردیده، شیوع این تومور به ترتیب ۵۶٪/۰ و ۵٪/۰ و سایر مطالعات در ۳٪/۰ از کل آپاندکتومی‌ها ذکر گردیده است [۱۲۵].

در مطالعه‌ای که توسط ساندور^۲ و همکاران بر

در بررسی میکروسکوپی، همه تومورها از نوع کارسینوئید کلاسیک بوده اند و موردی از تومور آدنوکارسینوئید مشاهده نشد. تمام تومورها در دم آپاندیس و قطر متوسط آنها حدود ۷۳٪/۰ سانتی‌متر با دامنه قطری (۱۵٪/۰-۳۱٪/۰) سانتی‌متر بوده اند.

جدول ۲ نتایج بررسی تومورهای کارسینوئید آپاندیس

سن	جنس	اندازه قطر (cm)	محل	پاتولوژی	درمان
۱۳	مونش	۰/۸	دیستال	کلاسیک	
۱۴	مذکر	۰/۵	دیستال	کلاسیک	
۱۸	مونش	۰/۵	دیستال	کلاسیک	
۱۸	مذکر	۱/۵	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده
۱۸	مذکر	۰/۵	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده
۱۸	مونش	۰/۵	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده
۳۳	مذکر	۰/۸	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده
۳۸	مونش	۰/۵	دیستال	کلاسیک	
۵۸	مونش	۰/۳	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده
۶۲	مونش	۱/۲	دیستال	کلاسیک	
۸۰	مذکر	۱	دیستال	کلاسیک	آپاندکتومی ساده

روی ۱۵۷ تومور کارسینوئید آپاندیس انجام شده است، شیوع این تومور در زنان ۱/۴٪/۰ برابر بیشتر از مردان بود و سن بروز آن کمتر و بطور متوسط ۳۰ سالگی بود. ۷۱٪/۰ در نوک آپاندیس، ۲۳٪/۰ در تنہ و ۷٪/۰ در قاعده آن قرار داشت [۱۳].

در بررسی انجام شده توسط مودلین^۳ و ساندور و همکاران که بر روی ۸۳۰ تومور کارسینوئید انجام شده شیوع این تومور در زنان بیش از مردان بود و سن بروز به طور قابل توجیه پایین تر و بطور متوسط ۲۰ سالگی بوده است [۱۴].

در تحقیقی که توسط ویلاند^۴ بر روی ۱۳۷ مورد آپاندکتومی صورت گرفت، ۵ مورد تومور کارسینوئید کشف شد و شیوع تومور کارسینوئید ۴٪/۰ بود و نسبت مردان به زنان ۴ به ۱، سن متوسط مبتلایان ۲۹/۲ سالگی بود و تمام موارد در دیستال آپاندیس با اندازه متوسط حدود ۶ سانتی‌متر بوده است [۱۵].

بحث

در این مطالعه که بر روی ۵۶۴ مورد آپاندکتومی، درییمارستان فاطمی اردبیل انجام شد، شیوع تومور کارسینوئید ۱۹٪/۰ و سن متوسط زمان تشخیص ۳۳/۶ سالگی با انحراف معیار ۲۳/۱ سال و میانگین اندازه قطر تومور 0.37 ± 0.74 سانتی‌متر بود. میانگین سن ابتلاء در مردان ۳۲/۶ و در زنان ۳۴/۵ سالگی بوده و میانگین اندازه تومور در مردان ۸۶٪/۰ سانتی‌متر و در زنان ۶۳٪/۰ سانتی‌متر بود که با آزمون T، اختلاف معنی داری در جنسیت ($t=0.13$ و $p=0.9$) و اندازه تومور ($t=1.02$ و $p=0.33$) بدست نیامد. در یک تحقیق که بر روی ۱۲۳۷ مورد آپاندکتومی آپاندیس با شیوع ۴٪/۰ با مورد تومور کارسینوئید آپاندیس با شیوع ۴٪/۰ متوسط سنی ۲۲/۹ سالگی یافت شده است که تمام موارد آن نیز در دم آپاندیس با قطر متوسط ۶ سانتی‌متر بوده اند [۱۱].

¹ Real

² Sandor

³ Modlin

⁴ Weiland

در مورد شیوع تومور کارسینوئید، مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را گزارش می‌دهند، به طوری که میزان شیوع این نئوپلاسم در مطالعات رئال و ویکیج به ترتیب $56\% / 50\%$ کل موارد آپاندکتومی هارا شامل می‌شود [۱۲۵].

نتایج مطالعه ساندور و همکاران از نظر شیوع جنسی مشابه نتایج این مطالعه است [۱۳].

نتیجه گیری

این تومور با انسداد مجرای تواند آپاندیست حد ایجاد کند، ولی اکثراً بطور اتفاقی در حین امتحان پاتولوژی یافت می‌گردد. با توجه به عدم گزارش تومور کارسینوئید در تنہ و قاعده آپاندیس دریشتر مطالعات و همچنین در بررسی اخیر پیشنهاد می‌شود که در موقع تهییه نمونه‌های آپاندیس در صورت امکان برش طولی داده شده و بجای برش روتین معمول تمام مقطع طولی آپاندیس در سه یا چهار تکه بررسی شود.

در ایران طی مطالعه‌ای که توسط پروانه وصال و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی ۷۴۴۷ مورد آپاندکتومی انجام شده ۱۸ مورد تومور کارسینوئید با شیوع $24\% / 20\%$ در نمونه‌های آپاندکتومی، با سن متوسط ۳۰ سالگی گزارش شده است و شیوع آن در زنان $2/5$ در هزار و در مردان $2/3$ در هزار بوده است [۱۶].

بررسی پنجاه ساله بر روی ۱۳۷۱۵ تومور کارسینوئید نشان داده است که شیوع تومور در سی سال گذشته در حال افزایش می‌باشد و به $1-2\%$ در هر صد هزار نفر رسیده است. 12% تومور کارسینوئید در آپاندیس بوده و پیک سنی در هنگام تظاهر بالینی $40-50$ سالگی می‌باشد و شیوع تومور کارسینوئید آپاندیس $32\% / 30\%$ در بیماران تحت آپاندکتومی بوده است [۱۷].

شیوع تومور کارسینوئید در مطالعه دیگری که بر روی بیماران تحت آپاندکتومی صورت گرفته است $9\% / 18\%$ است.

Reference

- 1- Fornero G, Rosatol. Carcinoid of cecal appendix. Minerva chirurgica. 1997 Jan-Mar; 52(10): 1223-6.
- 2- Rosai J, Ackermans. Surgical Pathology . Mosby ,U.S.A. 1996. 722-24.
- 3- Stephen S, Sternberg. Diagnostic surgical pathology Lippincott Williams, 3rd ed. USA, 1999; 1445.
- 4- Papalombros E, Archimanritis A, Pikoulis E, Nikou G. Carcinoid of the ampulla of vater: presentation of a new cases. Int surgery;64-66 ,2005.
- 5- Vicic, Zaloudik J. Carcinoid of appendix in incarcerated femoral hernia. Rozhl Chir. 1999; 75: 359-61.
- 6- Angeletti S, Annibale B, Margna M. Natural history of intestinal carcinoids. Italian J of Gastroenterology. 1999; 31 (2): 108-110.
- 7- Whitehead R. Gastrointestinal and esophageal pathology. Churchill Livingstone. 1995: 741-750.
- 8- Sternberg S. Diagnostic Surgical Pathology, Carcinoid Tumor, Raven press, 2nd ed,U.S.A, 1999; 1446-1447.
- 9- Connor SJ, Hanna GB, Frizelle Fa. Appendiceal tumors; Retrospective clinicopathologic analysis of appendiceal tumors from 7970 appendectomies . Diseases of the Colon Rectum. 1998; 41: 75- 80.
- 10- Bonati L, Rubini P, Pavarini E. Carcinoid of the appendix. Observation on 4 cases. Minerva Chir. 1998 May; 53 (5): 435-9.
- 11- Tchana-Satto V, Detry O, Polus M, Thiry A, Detroz B, Maweja S, et al. Carcinoid tumor of the appendix: a consecutive series from 1237 appendectomies. World J Gastroenterol. 2006 Nov; 12(41): 6699-701.
- 12- Reale D, Sgroi G, Mezzanotte C, Corti D, Pezzica E. Carcinoid tumours of the cecal appendix . Minerva Chir. 1997; 52; 1157-62.
- 13- Sandors A, Modlin IM. A retrospective analysis of 1570 appendiceal carcinoid Am J Gastroenterol 1998; 93: 422-8.
- 14- Modlin IM, Sandor A. An analysis of 8305 cases of carcinoid tumors, cancer. 1997; 76: 813- 829.

-
- 15- Weiland LH, Nagorxey DM, Dockerty MB. Carcinoid tumor of the appendix, treatment and programmes. NE Mg J Med. 1987; 317.
- ۱۶- پروانه وصال، بررسی شیوع جنسی و سنی تومور کارسینوئید بر روی ۷۴۴۷ مورد آپاندکتومی در دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه دکترا، دانشگاه شهید بهشتی تهران، پائیز ۱۳۷۹.
- 17- Modin IM, Lye KD, Kidd M. A 5- decade analysis of 13, 715 carcinoid tumors. Cancer. 2003Feb; 97 (4): 934-59.
- 18- Goede AC, Caplin ME, Winslet MC. Carcinoid tumour of the appedix. Br J Surg. 2003 Nov; 90 (11): 1317- 22.