

لَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ
وَالنَّسْكُ الْمُبِينُ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری رشته پزشکی

عنوان:

تعیین میزان اثر دوز یادآور واکسن دوگانه بالغین بر عود و بهبود آفت راجعه دهانی مینور

استاد راهنما:

دکتر شهرام حبیب زاده

دکتر حسن عدالخواه

استاد مشاور:

دکتر هادی پیری

نگارش:

مهدى شیخ رحیمی

زمستان ۱۳۹۴

شماره پایان نامه:

۰۵۶۰

شماره کارآزمایی بالینی:

IRCT ۲۰۱۵۰۱۲۱۱۳۹۸۹N1

فهرست مطالب

عنوان	
صفحه	
فصل اول: مقدمه و بیان مسئله	
۲	۱-۱ مقدمه و بیان مسئله.....
۳	۱-۲ تعریف واژه‌های کلیدی.....
۴	۱-۳ اهداف و فرضیات.....
۴	۱-۳-۱ هدف کلی.....
۴	۱-۳-۲ اهداف اختصاصی.....
۴	۱-۳-۳ فرضیات تحقیق.....
۵	۱-۳-۴ هدف کاربردی.....
فصل دوم: پیشینه تحقیق	
۷	۱-۲ کلیات آفتونوس.....
۷	۱-۱-۱ علایم شایع آفت دهان.....
۸	۱-۱-۲ عوامل مستعد کننده آفت.....
۸	۲-۱-۱ عوامل ایجاد کننده آفت.....
۱۲	۲-۱-۲ انواع آفتونوهای راجعه.....
۱۴	۲-۲-۱ درمان.....
۱۶	۲-۲-۲ مطالعات مشابه.....
فصل سوم: مواد و روش‌ها	
۱۸	۱-۳ نوع مطالعه.....
۱۸	۲-۳ محیط پژوهش.....
۱۸	۳-۳ جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه.....
۱۸	۴-۳ روش گردآوری اطلاعات.....
۱۹	۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی آماری.....
۱۹	۶-۳ معیار ورود.....
۱۹	۷-۳ معیار خروج.....

۲۰	۸-۳ ملاحظات اخلاقی
۲۰	۹-۳ محدودیت مطالعه
۲۰	۱۰-۳ متغیر های مطالعه
	فصل چهارم: نتایج
	فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۴۰	۱-۵ بحث
۴۳	۲-۵ نتیجه گیری
۴۴	۳-۵ محدودیت پژوهش
۴۳	۴-۵ پیشنهادات
۴۵	منابع
۴۸	چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها و جداول

عنوان	
صفحه	
نmodar ۱-۴ : فراوانی بیماران هر دو گروه به تفکیک جنسیت ۲۳	۲۳
نmodar ۲-۴ : فراوانی بیماران هر دو گروه به تفکیک سطح تحصیلات ۲۳	۲۳
نmodar ۳-۴ : فراوانی بیماران هر دو گروه به تفکیک تأهل ۲۴	۲۴
جدول ۱-۴ : فراوانی میانگین سنی در گروههای درمان و پلاسیو ۲۵	۲۵
جدول ۲-۴ : فراوانی وضعیت بهبود آفت در گروههای درمان و پلاسیو ۲۵	۲۵
جدول ۳-۴ : ارتباط میان سن و بهبود ضایعات آفتی دهان ۲۶	۲۶
جدول ۴-۴ : ارتباط میان جنسیت و بهبود ضایعات آفتی دهان ۲۷	۲۷
جدول ۵-۴ : ارتباط میان تحصیلات و بهبود ضایعات آفتی دهان ۲۸	۲۸
جدول ۶-۴ : ارتباط میان شغل و بهبود ضایعات آفتی دهان ۲۹	۲۹
جدول ۷-۴ : ارتباط میان تأهل و بهبود ضایعات آفتی دهان ۳۰	۳۰
جدول ۸-۴ : ارتباط میان بیماری همراه و بهبود ضایعات آفتی دهان ۳۱	۳۱
جدول ۹-۴ : فراوانی میانگین شدت درد قبل و بعد از درمان بین گروههای موردمطالعه ۳۲	۳۲
جدول ۱۰-۴ : مقایسه سرعت بهبود آفت قبل و بعد از درمان بر حسب گروههای موردمطالعه ۳۳	۳۳
جدول ۱۱-۴ : مقایسه فاصله زمانی عود آفت قبل و بعد از درمان بین گروههای درمان و پلاسیو ۳۴	۳۴
جدول ۱۲-۴ : مقایسه تعداد تقریبی آفت قبل و بعد از درمان بین گروههای درمان و پلاسیو ۳۵	۳۵
جدول ۱۳-۴ : مقایسه سایز تقریبی ضایعات آفتی قبل و بعد از درمان بین گروههای درمان و پلاسیو ۳۶	۳۶
جدول ۱۴-۴ : ارتباط میان سابقه ابتلا به آفت و بهبود ضایعات آفتی دهان در بین دو گروه ۳۷	۳۷
جدول ۱۵-۴ : ارتباط میان سابقه فامیلی و بهبود ضایعات آفتی دهان در بین دو گروه ۳۸	۳۸

فهرست علایم اختصاری

RAS: Recurrent aphthous stomatitis

HIV : Human Immunodeficiency Virus

DT: Diphtheria- Tetanus

تعیین میزان اثر دوز یادآور واکسن دوگانه بالغین بر عود و بهبود آفت راجعه دهانی مینور

چکیده

مقدمه و بیان مسئله

آفت دهانی اولسرهای راجعه دهانی هستند اغلب دردناک بوده و زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تاکنون درمان قطعی برای این زخمهای یافت نشده است. مطالعه حاضر میزان اثر دوز یادآوری واکسن دوگانه بالغین را در بهبود و عود آفتوسها بررسی می‌کند.

مواد و روشها

مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی، که در آن ۶۶ بیمار مبتلا به آفت مینور (MiRAS) بطور تصادفی در دو گروه ۳۳ نفری شامل گروه درمان و گروه پلاسبو وارد مطالعه شدند. برای گروه درمان یک دوز واکسن یادآور دوگانه بزرگسالان(نیم سی سی) تزریق شد و به مدت ۵ روز روزانه ۱ میلی گرم کلشی سین دریافت نمودند، برای گروه پلاسبو یک دوز (نیم سی سی) آمپول ویتامین B6 تزریق شد و روزانه یک میلی گرم کلشی سین به مدت ۵ روز دریافت نمودند. انتهای هر ماه و به مدت ۶ ماه بیماران از نظر بهبودی و عود، بیماران تحت نظر قرار گرفتند. و اطلاعات گردآوری شده در برنامه آماری وارد و آنالیز گردید.

نتایج

در گروه درمان ۷۵/۸ درصد شرکت کننده مرد بودند میانگین سنی در این گروه ۳۸/۰۳ سال و میانگین مدت ابتلا به بیماری ۱۱/۷۲ سال بود. و ۶۶/۵ درصد بیماران سابقه خانوادگی آفت مثبت بوده است. در گروه پلاسبو ۶۹/۷ درصد شرکت کنندگان مرد بودند میانگین سنی بیماران ۳۹/۹ سال و میانگین ابتلا به بیماری ۱۰/۸۴ سال و ۶۳/۷ درصد بیماران سابقه خانوادگی مثبت داشتند. و این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود. بهبودی کامل و نسبی ضمایمات در ۸۱/۸ درصد بیماران گروه درمان و ۳۹/۴ درصد گروه پلاسبو مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد واکسن یادآوری دوگانه بالغین در درمان آفتهای راجعه موثر است. فلذا می‌توان واکسن دوگانه بالغین را خط اول درمان MiRAS توصیه کرد.

کلمات کلیدی: بیماری اتوایمیون، آفت راجعه دهانی مینور، آفت راجعه مژوزر، واکسن یادآوری دوگانه (DT)، پلاسبو