



بررسی میزان رعایت دو امضای نوشتن گزارش پرستاری داروهای پرخطر

زهرا خلیلی^{۱*}، رباب نظری^۲، علی صدرالهی^۳

۱: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

نویسنده مسئول: khalili.nurse@gmail.com

۲ کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، واحد بهبود کیفیت بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران:

۳: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

مقدمه: به دلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده داروهای پرخطر، کنترل تزریق و پیشگیری از عوارض آن‌ها، جز وظایف پرستاران است. مطالعه حاضر باهدف بررسی رعایت خطمشی دو امضای بودن گزارش‌های پرستاری داروهای پرخطر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال در سال ۱۳۹۳ انجام شد.

روش: جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرونده‌های پزشکی تمامی بخش‌های بیمارستان در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ بررسی شدند و گزارش‌هایی که دارای دستور دارویی پرخطر بودند استخراج گردید. سپس طبق چک‌لیست دو مهره بودن گزارش‌های بررسی شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ میزان دو امضا و دو مهره بودن گزارش‌های پرستاری با دستورات داروهای پرخطر پتیدین، مرفین، متادون، کلرید پتاسیم، سولفات منیزیوم، دیگوکسین وریدی، خون و فرآورده‌های آن، ترکیبات تغذیه کامل وریدی و انسولین نسبت به سه‌ماهه دوم سال کمتر بود؛ و از بین بخش‌ها، بخش CCU بیشترین آمار دو مهره بودن گزارش‌های را داشت. به‌طورکلی میزان رعایت کردن این خطمشی ۷٪ بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تزریق داروی پرخطر و مشکلات جانبی آن‌ها، لزوم رعایت خطمشی تزریق این داروها ضروری به نظر می‌رسد. تا از خطرات احتمالی پیشگیری و کاسته شود.

کلمات کلیدی: پرستاری، دارو، خطر