



بررسی میزان مصرف داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال

ریاب نظری^۱، زهرا خلیلی^{۲*}، علی صدراهی^۳

۱: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، واحد بهبود کیفیت بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

۲: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

نویسنده مسئول: khalili.nurse@gmail.com

۳: کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

مقدمه: تجویز صحیح و منطقی دارو یکی از عوامل مهم تامین کننده امنیت سلامت جامعه به شمار می‌رود. بی توجهی به مصرف منطقی دارو پیامدهایی چون ایجاد عوارض جانبی خطرناک و افزایش هزینه‌های درمانی برای افراد و دستگاه‌های دولتی را دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مصرف داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال انجام شد.

روش: جمع آوری اطلاعات تمامی مستندات و برگه‌های درخواست داروی مخدر تمامی بخش‌ها در سال ۱۳۹۳ استخراج و بررسی شدند.

یافته‌ها: آمارها نشان داد آمپول مرفین ۱۰۰ میلی گرم، پتدین ۱۰۰ و ۵۰ میلی گرم بیشترین درخواست‌ها را داشته است. بطوریکه در طول سال ۱۳۹۳، میزان مصرف آمپول مرفین ۷۱۳ عدد، آمپول پتدین ۵۰ میلی گرمی ۲۰۴۳ عدد و آمپول پتدین ۱۰۰ میلی گرمی ۴۰۴۷ عدد بوده است. که این میزان در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال بیشتر بود. بیشترین بخش‌های مصرف کننده داروی مخدر به ترتیب اورژانس، داخلی و جراحی بود.

نتیجه‌گیری: مصرف زیاد داروها نه تنها به سلامت بیمار و جامعه کمک نمی‌کند بلکه به دلیل اثرات جانبی و عوارضی که دارد می‌تواند مشکلات و معضلات جدی را نیز سبب شود.

کلمات کلیدی: دارو، بیمارستان، مخدر