



هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی

بررسی عوامل خطرساز سرطان دستگاه گوارش (مطالعه موردي: بیمارستان امام خمینی اردبیل)

ترکان عبدالیلی^۱، زهرا حقیقی^۲، عزیزه عالی پناه^۳، مرتضی عالیقداری^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳- کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دبیر آموزش و پرورش شهرستان سرعین

۴- عضویت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

سابقه و هدف:

سرطان پس از بیماری های قلبی- عروقی و تصادفات، سومین عامل مرگ و میر در ایران می باشد. عوامل محیطی و سبک زندگی در بروز سرطان نقش بازی دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین برخی عوامل خطرساز سرطان دستگاه گوارش در بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی اردبیل، در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت.

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جمع آوری اطلاعات (۱۰ نمونه)، از طریق بررسی پرونده های پزشکی موجود در بیمارستان (۶۰ نمونه) و مصاحبه با بیماران (۴۲ نمونه)، صورت گرفت. داده ها براساس مشخصات فردی و عوامل خطر ساز و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها:

۷۱/۶٪ نمونه های موردنظری مرد و ۲۸/۴٪ زن و میانگین سنی مبتلایان ۶۱/۴۹±۱۲/۶۲۹ سال بود. ۹۱/۲۰٪ مبتلایان متاهل و بیشترین درصد ابتلاء به سرطان دستگاه گوارش، به ترتیب مربوط به سرطان معده، کولون، مری و رکتوم بود. ۲۶/۵۰٪ مصاحبه شوندگان سیگاری و ۶۷/۶٪ آنان هرگز سیگار مصرف نکرده بودند. ۴/۹٪ مصاحبه شوندگان مصرف سیگار را حداقل به مدت ۶ ماه قطع نموده و ۱٪ آن ها گاهی اوقات (کمتر از یک نخ در هفته) سیگار مصرف کرده بودند. ۶۴/۳٪ مصاحبه شوندگان از عوامل زمینه ساز ابتلاء به سرطان آگاهی نداشتند. سطح اضطراب در ۴۲/۹٪ مصاحبه شوندگان متوسط به پایین و مصرف غذا و چای داغ در بین آن ها، به ترتیب ۵/۰ و ۶۱/۹٪ بود. ۵/۹٪ مصاحبه شوندگان، از آب لوله کشی به صورت مستقیم برای آشامیدن استفاده می کردند. ۵۴/۸٪ مصاحبه شوندگان، گوشت قرمز را بیش از سه وعده در هفته مصرف نموده و مصرف کمتر از ۳ بار سیر، سبزیجات و میوه در هفته در بین آن ها، به ترتیب ۷۸/۶٪، ۵/۹٪ و ۴۵/۲٪ بود.

نتیجه گیری:

تعداد مبتلایان به سرطان معده نسبت به سایر انواع سرطان دستگاه گوارش بالا بود. برخی عوامل خطرزا از جمله مصرف غذا و چای داغ، مصرف بیش از ۳ وعده گوشت قرمز در هفته و مصرف کمتر از ۳ بار سیر، سبزیجات و میوه در هفته، در بین مبتلایان به انواع سرطان دستگاه گوارش مشترک بود.