


دہلی میڈیکل کالج
ویمنز اسپریتھیکل سینٹر
میڈیکل کونسلینگ سینٹر

**8th International Congress
Obstetrics and Gynecology**

5-9 ,Nov , 2009



ڈاکٹر مامائی
گروہ مامائی

Book

توجه به تغییر فلورواژن موجب رشد عوامل غیر کاندیدا می شود و از طرفی عودهای مکرر منجر به پیدایش سوش های مقاوم کاندیدا نسبت به داروهای رایج می شود در دهه های اخیر استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است اثرات ضد قارچی گیاه مورت بر طیف وسیعی از قارچ ها به ویژه کاندیدا آلبیکانس مشخص شده است بدین منظور این تحقیق با هدف مقایسه اثرات درمانی قرص کلوتریمازول واژینال و کرم واژینال مورت بر واژینیت کاندیدایی انجام گرفت

مواد و روشها: این تحقیق یک کار آزمایی بالینی بود که برروی ۸۰ بیمار با علائم ولوواژینیت کاندیدایی صورت گرفت نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام و ابتلا به بیماری توسط آزمایش قارچ شناسی تایید گردید . بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم و تحت درمان به مدت ۷ روز با قرص واژینال کلوتریمازول (mg100) و کرم واژینال مورت(۵درصد) قرار گرفتند اطلاعات موردنیاز قبل و بعد از درمان از طریق پرسشنامه و یافته های آزمایشگاهی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های مجذور کای Student -T، آزمون همبستگی اسپرمن انجام شد

یافته های پژوهش: میزان بهبودی یک هفته پس از درمان در گروه تحت درمان مورت نسبت به گروه کلوتریمازول اختلاف معنی داری را نشان داد (۰/۰۰۵) $< p$ میزان عود در گروه درمانی مورت و کلوتریمازول به ترتیب $\frac{9}{4}$ و $\frac{6}{3}$ بود که اختلاف معنی داری مشاهده نگردید

نتیجه گیری : نتایج این تحقیق بیانگر موثر بودن کرم واژینال ۵ درصد مورت در بهبودی علائم و لوواژینیت کاندیدایی نسبت به داروی کلوتریمازول می باشد


کلمات کلیدی : عفونت قارچی - گیاه مورت - کلوتریمازول

درک تجربیات مردان واژکتومی
شده اردوییل به روش تری
انگولیشین

یوسف حمیدزاده اربابی، دکتر نسرین
فولادی، دکتر داود گله دار، افروز مردی

مقدمه هدف : با توجه به رشد سریع جمعیت، فعالیتهای همه جانبیه ای جهت یافتن روش های مناسب پیشگیری از بارداری در سراسر جهان صورت گرفته است. از میان روش های مطمئن پیشگیری از بارداری، روش بستن لوله ها را می توان نام برد که علی رغم مزایای واژکتومی، آمار استفاده از آن بطور چشمگیری کمتر می باشد. و لذا توجه به مردان و دخالت دادن آنان در استفاده از روش های پیشگیری از بارداری به منظور کنترل جمعیت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی و درک تجربیات مردان از عمل واژکتومی اجرا گردید

مواد و روشها: این طرح، ترکیبی از یک مطالعه کیفی و کمی بود که روی مردان واژکتومی شده سالهای قبل از ۸۵ شهرستان اردبیل انجام گردید. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و پس از آنالیز محتوای با استفاده از نتایج حاصل از مطالعه کیفی، پرسشنامه کمی تهیه و پس از تکمیل توسط افراد واژکتومی شده با استفاده از نمونه گیری در دسترس از ۱۰۱ نفر بدست آمد و با استفاده از برنامه SPSS با آمار توصیفی و تحلیلی مورد آنالیز قرار گرفت یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج این تحقیق در بخش کیفی از آنالیز اطلاعات سه طبقه اصلی: طبقه اول شامل عوامل موثر بر انجام واژکتومی با سه زیر طبقه شامل عوامل درون خانوادگی، عوامل مربوط به روش پیشگیری، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر واژکتومی؛ طبقه دوم شامل نتایج واژکتومی با دو زیر طبقه نتایج مثبت و منفی حاصل از واژکتومی و طبقه سوم فرد واژکتومی شده عامل اصلی برای اطلاع رسانی در مورد واژکتومی بدست آمد نتایج بخش کمی مطالعه نیز مشخص کرد که همانگی بین نتایج در بخش کمی و کیفی وجود دارد. همچنین، مشخص شد که ۹۵٪ افراد واژکتومی شده از عمل خود راضی هستند اما حدود ۲۰٪ دچار مشکلات جنسی می باشند. حدود ۲۰٪ نیز اظهار کرده اند که دارای مشکلات جسمی یا روانی می باشند. بنظر میرسد که در انجام واژکتومی بایستی تجدید نظر شود و افراد داوطلب را باندازه کافی راجع به کاربردها و اثرات مثبت و منفی این روش آشنا نمود و آنگاه اقدام به واژکتومی نمود. بعلاوه، از طریق رادیو و تلویزیون راجع به واژکتومی اطلاع رسانی بیشتری بعمل آورد واژه های کلیدی: تجارت مردان- واژکتومی، اردبیل، تری انگولیشن



مقدمه: زنان زندانی از فقدان معاینات منظم دستگاه تناسلی و سینه شکایت می کنند و می گویند که توجهات پزشکی اغلب در آنها نادیده گرفته می شود. به اضافه نسبت زیادی از این جمعیت قربانی تجاوزات فیزیکی و جسمی هستند و بیشتر از نصف آنها در معرض حاملگی های پر خطر و بیماری های تهدید کننده زندگی مثل ایدز، هپاتیت C و ویروس پابیلومای انسانی هستند که می توانند خطر سرطان سرویکس را زیاد کند قرار دارند.

بحث: تکیب چند فاکتور زن زندانی را در معرض خطر بالای استلا به این بیماری ها قرار میدهد. ابتدا در مقایسه با جمعیت عمومی زنان زندانی میزان تجاوز و مشکلات روحی همچنین