







اولین گنگره سراسری انجمن متخصصین زنان. مامایی نازایی ایران- شاخه خراسان 🔪 سرم.. ۱۹۷ مرداد مام

عنوان مقاله : بررسی میزان آگاهی زنان از خودآزمایی پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل، ۸۳

نویسنده یا نویسندگان : افروز مردی- زهرا تذکری- سهیلا رفاهی

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پست الکترونیک: mardi1091@yahoo.com

خلاصه:

مقدمه و هدف : سرطان پستان شایعترین سرطان زنان بوده و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود. بر اساس مطالعات موجود روشهای تشخص زودرس سرطان پستان، مرگ ومیر ناشی از بیماری را کاهش میدهد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی زنان و عوامل موثر بر آن در مورد خود آزمایی بستان صورت گرفت.

مواد و روشها : این مطالعه از نوع توصیفی بوده است، جامعه پژوهش کلیه زنانی بودند که در بهار سال ۸۳ به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل مراجعه کرده بودند. که میزان آگاهی ، عملکرد و عوامل موثر درآن در ۳۱۰ نفر از زنان ۵۵-۳۰ سال به روش نمونه گیری آسان و با تکمیل پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.

یافته های پژوهش : نتایج پژوهش نشان داد که ۲۱ ٪ زنان آگاهی خوبی در مورد خود آزمایی پستان داشتند و فقط ۱۳٪ BSE را انجام می دادند و بین میزان تحصیلات و ابتلای یکی از اعضای خانواده با میزان اگاهی افراد ارتباط معنی

نتیجه گیری : نتابج این پژوهش حاکی از آن است که اکثر زنان آگاهی خوبی در مورد خود آزمایی پستان ندارند لذا در این زمینه نیاز به آموزش بیشتر و افزایش آگاهی زنان وجود دارد .

كلمات كليدي: سرطان بستان-ميزان آگاهي- عوامل موثر

Subject: BSE and effected factors in women in Ardebil Health Clinics, 2005

Author(s): A. Mardi, Z. Tazakori, S. Refahi Address: Ardabil University of Medical Sciense Email: mardi1091@yahoo.com

Abstract:

Introduction & Objectives: Breast cancer is the most common cancer in women and the second reason of all cancers mortality over the world. According to studies screening and early diagnosis of that can reduce mortality rate, so the main aim of this study was to determine of women's knowledge and effected factors on breast self



ر اولین کنگره سراسری انجمن متخصصین زنان، مامایی نازایی ایران- شاخه فراسان

Materials & Methods: This research was a descriptive study and 310 women (30-55 years old) were selected randomly from Ardebil health clinics. Data were collected through a questionnaire including: Age, education, marriage statues, familial history, early menarche, high age at pregnancy or nullipariety, high fat diet and about breast self-examination and Analysed by descriptive statistics.

Results: Finding showed that most of patients were over 40 years old, married, urban, with low education and housekeeper. About 21% of women had enough knowledge about BSE but only 13% of them had practiced that before.

Conclusion: Results indicated that most of women had low knowledge about BSE and they need to more and effective educational programs to increase knowledge and improve their practice.

Key Words: Breast cancer - Women - Knowledge