

عنوان: شیوع درد پس از عمل جراحی در بیماران جراحی شده در بیمارستانهای فاطمی و علوی اردبیل

نویسندگان: دکتر مسعود انتظاری اصل (گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)، دکتر خاطره عیسی زاده فر (پزشک عمومی)

آدرس: اردبیل - بیمارستان علوی، Masood Entezari 2003 @ Yahoo .Com

اهداف: درد بعد از عمل یکی از مشکلات شایع دوره ریکاوری بوده و شیوع درد بعد از عمل بسته به نوع تکنیکهای بیهوشی عمومی و یا بیحسی های موضعی و نیز نحوه استفاده از داروهای مختلف می تواند بسیار متغیر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع درد پس از عمل در میان بیماران جراحی شده بیمارستانهای فاطمی و علوی اردبیل و شناسایی عوامل خطر ساز احتمالی دخیل در این عارضه بوده است.

روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، مقطعی ۱۶۰ بیمار داوطلب اعمال جراحی مختلف انتخاب و پرسشنامه های مربوطه در مورد آنها تکمیل گردید و از نظر بروز درد در دوره بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درد بعد از عمل در ۲۶/۹٪ از بیماران دیده شده است که در بیماران مونث اندکی بیشتر از بیماران مذکر بوده است. (۲۸/۱٪ در مقابل ۲۵/۴٪). از نظر محل عمل جراحی بالاترین میزان درد در اعمال جراحی توراکس (۱۰۰٪ موارد) و اعمال جراحی پاراتومی تحتانی (۳۴/۱٪ موارد) بوده است. از نظر طول مدت جراحی رابطه معنی داری بین افزایش زمان جراحی و درد بعد از عمل مشاهده نشده است. از نظر تکنیک بیهوشی درد بعد از عمل در ۲۹/۷٪ موارد بیهوشی عمومی و ۱۰٪ موارد بعد از بیحسی اسپینال مشاهده شده است. ارتباط معنی داری بین مصرف داروها و سابقه مصرف سیگار و موار مخدر و درد بعد از عمل مشاهده نشد.

نتیجه گیری: درد بعد از عمل جراحی مشکل نسبتاً شایعی بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. توجه به عوامل مستعد کننده درد بعد از عمل، آماده سازی روانی بیمار برای پذیرش بیهوشی و استفاده مناسب و به مقدار کافی از داروهای ضد درد میتواند نقش موثری در کاهش این عارضه داشته باشد.